



Australian Government



# ຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊີນຕົ້ນ COVID-19 ຂອງທ່ານ - Pfizer

## ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ

ມື້ນີ້ທ່ານກໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນທີ່ມີຊື່ວ່າ **Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd)**.

ຢາວັກຊີນຊະນິດນີ້ສາມາດປ້ອງກັນຄົນຈາກການເຈັບປ່ວຍຍ້ອນ COVID-19. Comirnaty ບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສທີ່ມີຊີວິດປະສົມຢູ່ ແລະ ມັນຈະບໍ່ສາມາດໃຫ້ເຊື້ອ COVID-19 ແກ່ທ່ານໄດ້. ມັນປະກອບດ້ວຍລະຫັດພັນທຸກຳສຳລັບພາກສ່ວນອັນສຳຄັນຂອງເຊື້ອໄວຣັສ SARS-CoV-2 ທີ່ເອີ້ນວ່າໂປຣຕີນຫຼີ້ແຫຼມຄົມ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສັກຢາ, ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະເຮັດໜ້ອຍປະສານຂອງໂປຣຕີນແຫຼມຄົມນີ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງທ່ານກໍ່ຈະທຳຄວາມຮູ້ຈັກແລະຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໄວຣັສ SARS-CoV-2. ລະຫັດພັນທຸກຳຈະແຍກອອກຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍຮ່າງກາຍ.

## ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊີນ

ເລີ່ມດຽວກັບຢາວັກຊີນຊະນິດອື່ນໆ, ທ່ານອາດຈະມີອາການຂ້າງຄຽງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ COVID-19.

**ອາການຂ້າງຄຽງ ທົ່ວໄປ** ຫຼັງຈາກສັກຢາ **Comirnaty** ລວມເຖິງ:

- ບຸນດຫຼືໃສ່ທີ່ບໍ່ລົດວນສັກຢາ
- ເມື່ອຍອ່ອນເພ່ຍ
- ເຈັບຫົວ
- ບວດຕາມກ້າມເນື້ອ
- ເປັນໄຂ້ ແລະ ໜາວສັ່ນ
- ບວດຕາມຂໍ.

**ອາການຂ້າງຄຽງ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເປັນ** ຫຼັງຈາກສັກຢາ **Comirnaty** ລວມເຖິງ:

- ເປັນຮອຍຜິນແດງທີ່ບໍ່ລົດວນສັກຢາ
- ບວດຮຸກ
- ຕ້ອມນຳເຫຼືອງໃຫຍ່ຂຶ້ນ
- ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ
- ເຈັບຕາມແຂນຂາ
- ບັນຫາເລືອງການນອນບໍ່ຫຼັບ
- ມີອາການຄັນທີ່ບໍ່ລົດວນສັກຢາ.

ອາການຂ້າງຄຽງເຫຼົ່ານີ້ຕາມປົກກະຕິຈະເປັນແຕ່ພຽງເບົາບາງແລະຈະຫາຍໄປພາຍມື້ໜຶ່ງຫຼືສອງມື້. ຜູ້ໄດ້ຮັບການສັກຢາບາງຄົນຈະຮູ້ສຶກມີອາການຄ້າຍໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໜັກກວ່າປົກກະຕິຈາກວັກຊີນຊະນິດນີ້ເມື່ອທຽບກັບຢາວັກຊີນຊະນິດອື່ນໆ ທົ່ວໄປແລະອາດຕ້ອງການເວລາພັກຈາກກິດຈະກຳທີ່ເຄີຍເຮັດປົກກະຕິ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສັກຢາຄັ້ງທີໜຶ່ງຫຼືຄັ້ງທີສອງແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສັກຢາຄັ້ງທີສອງ.

ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກເຈັບທີ່ບໍລິເວນສັກຢາຫຼືມີອາການໄຂ້ເຈັບຫົວຫຼືປວດຕາມຮ່າງກາຍຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນ, ທ່ານສາມາດກິນຢາແກ້ປວດ paracetamol ຫຼື ibuprofen. ອັນນີ້ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບາງອາການຂ້າງຄຽງ (ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກິນຢາ paracetamol ຫຼື ibuprofen ກ່ອນສັກຢາ). ຖ້າມີອາການໃຫຍ່ບໍລິເວນສັກຢາ, ທ່ານກໍສາມາດໃຊ້ຖົງເຢັນຂົມໄວ້ໄດ້.

**ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ເກີດໄດ້ຍາກ ທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຫຼັງຈາກສັກຢາ Comirnaty ແມ່ນ:**

- ປະຕິກິລິຍາແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ (anaphylaxis)

ທ່ານຕ້ອງໄປຫາໝໍຫຼັງຈາກວັກຊີນແລ້ວ ຖ້າວ່າ:

- ທ່ານຄິດວ່າທ່ານອາດມີປະຕິກິລິຍາຂອງອາການພູມແພ້ ໃຫ້ໂທຫາ 000 ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີອາການຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນ, ເຊັ່ນຫາຍໃຈຍາກ, ຫາຍໃຈຫອບ, ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງຫຼືຄວາມດັນລົງຕໍ່າ.
- ຖ້າທ່ານກັງວົນວ່າອາດເກີດອາການຂ້າງຄຽງໃດໜຶ່ງຫຼືມີອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຫຼືບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ.
- ທ່ານມີອາການຂ້າງຄຽງທີ່ຮູ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການສັກວັກຊີນແຕ່ວ່າອາການນັ້ນບໍ່ຫາຍໄປຫຼັງຈາກສອງສາມມື້ແລ້ວ.

ສໍາລັບອາການທີ່ບໍ່ຮີບດ່ວນ, ທ່ານສາມາດໄປຫາແພດດູແລສຸຂະພາບປະຈໍາຂອງທ່ານໄດ້ (ຕາມປົກກະຕິແມ່ນ GP).

**ການຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນແລະການລາຍງານອາການຂ້າງຄຽງ**

ທ່ານສາມາດລາຍງານອາການຂ້າງຄຽງທີ່ສົງໄສທີ່ກ່ຽວພັນກັບການສັກວັກຊີນຂອທ່ານກັບຜູ້ສັກຢາໃຫ້ທ່ານຫຼືເຈົ້າໜ້າທີ່ແພດອື່ນໆທີ່ດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. ເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການຕາງໜ້າທ່ານໄປຫາກະຊວງສາທາລະນະສຸກປະຈໍາລັດທີ່ເຂດປົກຄອງພິເສດຂອງທ່ານ ຫຼືລາຍງານໂດຍຕົງຫາຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າທີ່ໃນການປິ່ນປົວ (TGA).

ຖ້າທ່ານປະສົງຢາກລາຍງານດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ [reporting suspected side effects associated with a COVID-19 vaccine webpage](#) ຂອງເວັບໄຊຂອງ TGA ແລະເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ແຈ້ງໄວ້ໃນໜ້າເວັບໄຊນັ້ນ.

**ການກວດຫາ COVID-19 ຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນ**

ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການສັກຢາຕໍ່າມາ COVID-19 ອາດຄ້າຍຄືກັນກັບອາການຂອງພະຍາດ COVID-19 ເອງ (ຕົວຢ່າງ ມີອາການໄຂ້). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Comirnaty ບໍ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງເຊື້ອໄວຣັສທີ່ມີຊີວິດໃດໆແລະບໍ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ COVID-19. ທ່ານອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປກວດຫາ COVID-19 ຫຼືຕ້ອງແຍກປ່ຽວ:

- ຖ້າວ່າທ່ານເກີດມີອາການທົ່ວໆຂອງການເປັນໄຂ້, ເຈັບຫົວຫຼືອິດເມື່ອຍໃນລະຫວ່າງສອງມື້ທໍາອິດຫຼັງຈາກສັກວັກຊີນ, ແລະ
- ຖ້າທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານບໍ່ມີອາການຂອງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ (ເຊັ່ນ ນໍ້າມູກໄຫຼ, ໄອ, ເຈັບຄໍ, ບໍ່ຮູ້ສຶກໄດ້ກິນຫຼືລົດຊາດອາຫານ),

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງຄໍາແນະນໍາອັນບັດຈຸບັນທີ່ທາງລັດຖະບານ/ເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານອອກມາເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນອຸບັດຕິດໃໝ່ລ່າສຸດ. ຄໍາແນະນໍານີ້ອາດຈະປ່ຽນແປງໄປໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະບາດຂອງ COVID-19 ຂຶ້ນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງອາດຕ້ອງໄປເຮັດການກວດຫາ COVID-19 ຖ້າທ່ານຕົກຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂອື່ນ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໃກ້ຊິດກັບກໍລະນີທີ່ຮູ້ວ່າມີພະຍາດ COVID-19. ຖ້າສົງໄສ, ໃຫ້ໄປຮັບການກວດຈາກແພດ.

**ໃຫ້ຈື່ການນັດໝາຍຄັ້ງທີສອງຂອງທ່ານ**

ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາ Comirnaty (Pfizer) ເປັນຈໍານວນສອງໂດສ, ຢ່າງນ້ອຍຫ່າງກັນສາມອາທິດ. ຢາໂດສທີສອງມີແນວໂນ້ມວ່າຈະເຮັດໃຫ້ລະຍະການປົກປ້ອງຈາກ COVID-19 ຍາວນານຂຶ້ນ.

**ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ໃນມື້ນັດໝາຍຈະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງໃດ**

ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບກໍາ, ຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງໃດນັ້ນ ຂໍໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງ

<https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>