



Australian Government



# Czas po zaszczepieniu się przeciw COVID-19 – Pfizer

## Informacje na temat szczepionki

Otrzymałeś dzisiaj **szczepionkę Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd)**.

Szczepionka ta może uchronić cię przed zachorowaniem na COVID-19. Comirnaty nie zawiera żywych wirusów i nie może wywołać u ciebie COVID-19. Zawiera ona kod genetyczny odnoszący się do istotnej części wirusa SARS-CoV-2 - białka nazwanego białkiem szczytowym (spike protein). Po otrzymaniu szczepionki twój organizm wytworzy kopie białka szczytowego. Twój układ immunologiczny nauczy się wówczas rozpoznawać je i bronić się przed wirusem SARS-CoV-2. Jego kod genetyczny jest szybko przez organizm pokonany.

## Czego można spodziewać się po zaszczepieniu

Podobnie, jak w przypadku każdej innej szczepionki, po otrzymaniu szczepionki przeciw COVID-19 możesz doświadczyć pewnych skutków ubocznych.

**Typowe** skutki uboczne po szczepieniu **Comirnaty** to m.in.:

- ból lub obrzęk w miejscu zastrzyku
- uczucie zmęczenia
- ból głowy
- bóle mięśniowe
- gorączka i dreszcze
- bóle stawów.

**Rzadsze** skutki uboczne po szczepieniu **Comirnaty** to m.in.:

- zaczerwienienie w miejscu zastrzyku
- nudności
- powiększenie węzłów chłonnych
- złe samopoczucie
- bóle w kończynach
- bezsenność
- swędzenie w miejscu zastrzyku.

Te skutki uboczne są zwykle nieznaczne i ustępują w ciągu 1-2 dni. Pewne osoby, która przyjęły szczepionkę, mogą doświadczyć silniejszych objawów grypopodobnych w porównaniu z innymi szczepionkami, i wymagać odpoczynku od obowiązków życia codziennego. Tego typu objawy mogą pojawić się po każdej dawce, ale są częściej obserwowane po drugiej dawce.

Jeśli po szczepieniu doświadczysz bólu w miejscu zastrzyku, gorączki, bólu głowy lub bóli mięśniowych, przyjmij paracetamol lub ibuprofen. Leki te pomogą w złagodzeniu niektórych z powyższych objawów (nie trzeba brać paracetamolu ani ibuprofenu przed szczepieniem). Jeśli pojawi się obrzęk w miejscu zastrzyku, można zastosować zimny kompres.

**Rzadkie** skutki uboczne zgłoszone po podaniu szczepionki **Comirnaty** to:

- Silna reakcja uczuleniowa (anafilaksja)

Należy po zaszczepieniu się szukać porady lekarza, jeśli:

- wydaje ci się, że wystąpiła u ciebie reakcja alergiczna. Dzwon na numer 000, jeśli doświadczysz poważnych objawów, takich jak trudności z oddychaniem, świszczący oddech, przyspieszone bicie serca lub zasłabnięcie.
- niepokoją cię potencjalne skutki uboczne lub doświadczasz nowych lub niespodziewanych objawów.
- pojawiły się spodziewane skutki uboczne, ale nie znikają one po kilku dniach.

Z objawami, które nie są pilne, zgłoś się do swego zwykłego lekarza (najczęściej lekarza ogólnego).

## Monitorowanie bezpieczeństwa szczepionki i zgłaszanie skutków ubocznych

Podejrzane skutki uboczne możesz zgłaszać usługodawcy szczepień lub innemu pracownikowi służby zdrowia. Sporządzą oni w twoim imieniu oficjalny raport do wydziału zdrowia twojego stanu lub terytorium lub bezpośrednio do Urzędu Administracji Towarami Leczniczymi (Therapeutic Goods Administration, TGA).

Jeśli wolisz zgłosić skutki uboczne osobiście, prosimy o odwiedzenie strony [reporting suspected side effects associated with a COVID-19 vaccine](#) w witrynie TGA i kierowanie się instrukcjami podanymi na tej stronie.

## Badania laboratoryjne w kierunku COVID-19 po szczepieniu

Pewne skutki uboczne szczepionki przeciw COVID-19 mogą przypominać objawy COVID-19 (np. gorączka). Jednakże szczepionka Comirnaty nie zawiera żywych wirusów i nie może wywołać u ciebie COVID-19. Możesz nie potrzebować wykonania badań w kierunku COVID-19 ani izolować się, jeśli:

- wystąpią u ciebie objawy ogólne, takie jak gorączka, ból głowy czy znużenie, w pierwszych dwóch dniach po szczepieniu, oraz
- jesteś pewny, że nie doświadczasz żadnych objawów ze strony układu oddechowego (w tym kataru, kaszlu, bólu gardła, utraty węchu lub smaku).

Pomimo to powinieneś sprawdzić bieżące wytyczne twojego stanu lub terytorium. Zalecenie to może się zmienić w przypadku pojawienia się ogniska infekcji COVID-19 w twoim lokalnym rejonie. Możesz w dalszym ciągu potrzebować wykonania badań laboratoryjnych z innych względów, np. jeśli znalazłeś się w bliskim kontakcie z osobą zakażoną COVID-19. Jeśli masz wątpliwości, poradź się lekarza.

## Pamiętaj o drugiej wizycie

Ważne jest, aby otrzymać dwie dawki szczepionki Comirnaty (Pfizer), w co najmniej trzytygodniowym odstępie. Oczekuje się, że druga dawka przedłuży okres ochrony przeciw COVID-19.

## W jaki sposób wykorzystywane są informacje, które podasz w czasie wizyty

Po informacji o tym, jak są zbierane, przechowywane i wykorzystywane twoje dane osobowe, odwiedź stronę <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>