



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

ຄຳແນະນຳອັບເດດກ່ຽວກັບການເປີດ ສັກຢາວັກຊີນຕ້ານ COVID-19

17 ມິຖຸນາ 2021

ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດໃນອອສເຕຣເລັຍ ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນ Pfizer COVID-19 ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 60 ປີ. ຄຳແນະນຳແຕ່ກ່ອນໄດ້ເວົ້າວ່າຢາວັກຊີນ Pfizer ແມ່ນເໝາະສົມກວ່າສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 50 ປີ.

ຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ຖືກອັບເດດຄັ້ງນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກຖານໃໝ່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດຄິດ ໄວ້ແຕ່ຕົ້ນ ຂອງພາວະກ້ອນເລືອດອຸດຕັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຍາກ ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 50-59 ປີ. ພາວະນີ້ເອີ້ນວ່າ ພາວະກ້ອນເລືອດອຸດຕັນເນືອງຈາກມີກຸ່ມອາການສະເກັດເລືອດຕໍ່າ, ຫຼື TTS.

ຢາວັກຊີນ AstraZeneca ຈະໄດ້ສັກໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີແລະສູງກວ່ານັ້ນ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີແລະ ສູງກວ່ານັ້ນ, ຜົນປະໂຫຍດຈາກການສັກວັກຊີນແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດພາວະ TTS.

ການທີ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຍັງເປັນວິທີການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງຫຼືເສຍຊີວິດ ຈາກ COVID-19. ມີຄົນຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາຢ່າງປອດໄພ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາໂດສທຳອິດເປັນຢາວັກຊີນ AstraZeneca COVID-19 ໂດຍບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງຮ້າຍແຮງໃດໆ ຄວນສືບຕໍ່ສັກໂດສທີສອງຂອງຕົນຕໍ່ໄປ. ອັນນີ້ແມ່ນລວມເຖິງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 60 ປີດ້ວຍ.

ການໄດ້ຮັບຢາໂດສທີສອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການປົກປ້ອງທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງຍ້ອນ COVID-19. ຖ້າ ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາໂດສທຳອິດແລ້ວ ທ່ານຄວນນັດຈອງໄປສັກຢາໂດສທີສອງຂອງທ່ານ.

ຄລິນິກສັກຢາວັກຊີນຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ Pfizer ໃຫ້ຢູ່ແລ້ວກໍຈະເລີ່ມຮັບເອົາຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 50-59 ປີ ທັນທີ ເພື່ອຮັບການສັກຢາ Pfizer.

ຄົນໃນປະເທດອອສເຕຣເລັຍສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດຂອງພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ທົບທວນເບິ່ງຫຼັກ ຖານແລະຂໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກທີ່ນີ້ແລະຈາກຕ່າງປະເທດ. ໄດ້ມີການແນະນຳວ່າໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ມີສິດຈົ່ງໄປຮັບການສັກຢາ ວັກຊີນຕ້ານ COVID-19.

ເພື່ອທຳການນັດຈອງໄປສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ health.gov.au

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນຕ້ານ COVID-19, ຈົ່ງໂອ້ລົມກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານ, ເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages, ຫຼືໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໂຄໂຣນາໄວຣັສແຫ່ງ ຊາດທີ່ເລກໂທ 1800 020 080. ສຳລັບບໍລິການແປເອກະສານແລະນາຍພາສາ, ໃຫ້ໂທຫາ 131 450.