



Australian Government

COVID-19
VACCINATION

परिमार्जित गरिएको COVID-19 खोप प्रसारणको सुझाव

१७ जुन २०२१

अष्ट्रेलियाका मेडिकल विज्ञहरूले ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूको लागि फाइजर(Pfizer) COVID-19 खोपको सिफारिस गर्छन्। अधिल्लो चिकित्सा सल्लाह अनुसार ५० वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूको लागि फाइजर खोपलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

यो अद्यावधिक सल्लाह नयाँ प्रमाणमा आधारित छ जुन ५०-५९ वर्ष उमेर समूहहरूमा पहिलो सोचेको भन्दा बिरलै(कम) रगत जमाउने अवस्थाको बढी जोखिम देखाउँदछ। यस अवस्थालाई थ्रोम्बोसिसको साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिन्ड्रोम(thrombosis with thrombocytopenia syndrome), वा TTS भनिन्छ।

AstraZeneca खोप ६० वर्ष वा माथिका लाई दिइनेछ। ६० वर्ष वा माथिका व्यक्तिहरूका लागि, खोपका फाइदाहरू TTS को जोखिमभन्दा बढी छ।

खोप लगाउनु COVID-19 बाट गम्भीर बिरामी वा मृत्यु रोकनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिका हो। संसारभरिका लाखौं मानिसहरूलाई खोपहरू सुरक्षित रूपमा लगाई सकेकोछ।

कुनै पनि गम्भीर प्रतिकूल असर बिना AstraZeneca COVID-19 खोप को पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्तिहरूले अझै पनि आफ्नो दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्छ। यसमा ६० वर्ष भन्दा मुनिका वयस्कहरू संलग्न छन्।

तपाईंको दोस्रो मात्रा लगाउँदा COVID-19 बाट हुने गम्भीर बिरामी हुनबाट उत्तम सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं सँग आफ्नो पहिलो मात्रा लगाउनु भएको छ भने तपाईंले आफ्नो दोस्रो मात्राको लागि बुक(समय लिनु) गर्नु पर्छ।

पहिले नै फाइजर खोप दिने सरकारी खोप क्लिनिकहरूले ५०-५९ उमेरका व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त फाइजरका लागि स्वीकार गर्न थाल्छ।

अष्ट्रेलियाका मानिसहरू विश्वस्त हुन सक्छन् कि हाम्रो चिकित्सा विशेषज्ञहरू यहाँ र विदेशबाट प्रमाणहरू र आंकडा समीक्षा गर्न जारी नै छन्। सबैजनालाई COVID-19 खोप लिने सिफारिस गरिन्छ।

तपाईंको खोपलागि समय लिनकोलागि health.gov.au मा हेर्नुहोला।

थप जानकारीकोलागि

यदि तपाईं सँग COVID-19 खोपको बारेमा प्रश्नहरू छन्, तपाईंको डाक्टर सँग कुरा गर्न चाहानु हुन्छ भने, www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages मा जानुहोला, अथवा राष्ट्रिय कोरोना भाईरस मदत लाईन(National Coronavirus Helpline)को १८०० ०२० ०८० मा फोन गर्नुहोला। दोभाषे र उल्थाउने सेवा(Translating and interpreting services)को लागि १३१ ४५० मा फोन गर्नुहोला।