



Australian Government



# የኮቪድ/COVID-19 ክትባት AstraZeneca ኮቪድ/COVID-19 ክትባት ከወሰዱ በኋላ

ወቅታዊ የሆነበት ቀን: 30 ሐምሌ/July 2021 ዓ.ም

## ስለ ክትባቱ

ዛሬ የAstraZeneca ኮቪድ/COVID-19 ክትባት አግንተዋል።

ይህ ክትባት የሚከላከለው በAstraZeneca ኮቪድ/COVID-19 ክትባት ለሚፈጠር ህመም ማንኛውንም ህይወት ያለው SARS-CoV-2 ቫይረስን አያካትትም (ለኮቪድ/COVID-19 ምክንያት ለሚሆን ቫይረስ)፤ እንዲሁም ይህ ለርስዎ ኮቪድ/COVID-19 አጋልጦ መስጠት አይችልም። ስፓይክ ፕሮቲን/spike protein ለተባለ የSARS-CoV-2 ቫይረስ ጠቃሚ የሆነ አካል የጀነቲክ ኮድ ዝርያን ያካተተ ነው። የስፓይክ ፕሮቲን በመደበኛ ጉንፋን “ተሸካሚ” ቫይረስ (የአደናቫይረስ/adenovirus) ላይ እንደገባ ነው። የአደናቫይረስ ተሸካሚ በሰውነትዎ ሴሎች/ህዋስ ላይ ስፓይክ ፕሮቲን ስለሚያመጣ፤ መጀመሪያ ስለ ስፓይክ ፕሮቲን ማንበብ መቻል እንዳለባቸውና ቅጂውን ማግኘት ይኖርባቸዋል። ከዚያም የርስዎ በሽታ መቋቋም ህይወት አሰራር ቫይረሱን በመገንዘብ ከSARS-CoV-2 ቫይረስ ጋር ይዋጋል። የአደናቫይረስ ተሸካሚ ስለተለወጠ አንዴ በሴሎች/ህዋስ ውስጥ ከሆነ ሊባዛ አይችልም። ይህ ማለት ወደ ሴሎች ህዋስ እንደማይሰራጩና ብክለትን መፍጠር እንደማይችል ነው።

## ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ምን እንደሚጠበቅ

እንደ ማንኛውም ክትባት የኮቪድ/ COVID-19 ክትባት ከወሰዱ በኋላ አንዳንድ ችግሮች ሊፈጠር ይችላል ይሆናል።

**የAstraZeneca ኮቪድ/COVID-19 ክትባት ከወሰዱ በኋላ ከሚፈጠሩ የተለመደ ችግሮች:**

- መርፌውን በተወጉበት ቦታ ህመም፤ እብጠት፤ የመቅላት ወይም ማሳከክ
- የድካም መንፈስ
- እራስ ምታት
- የጅምት ህመም
- ማቅለሽለሽ
- ትኩሳትና ብርድ ብርድ ማለት
- ደህና አለመሆን ስሜት
- የመገናኛ ህመም ይሆናል።

**AstraZeneca ኮቪድ/COVID-19 ክትባት ከወሰዱ በኋላ ከሚፈጠሩ ባልተለመደ ቀላል ችግሮች ላይ የሚካተት:**

- በመገጣጠሚያ ያለ ትልቅ የፈሳሽ እብጠት
- በእጅ እግር ላይ ህመም
- ግራ መጋባት
- የምግብ ፍላጎት መቀነስ

[health.gov.au/covid19-vaccines](https://health.gov.au/covid19-vaccines)

After your AstraZeneca COVID-19 Vaccination - 14082021 - Amharic

- የሆድ እቃ ህመም ይሆናል።

እነዚህ የሚከሰቱት ችግሮች ብዙ ጊዜ መካከለኛ ናቸው። እነዚህ የሚከሰቱት ክትባቱን ለወሰዱ በሁለት-ሶስተኛ ሰዎች ሲሆን የሚጀምረውም ክትባቱን በወሰዱበት ቀን እንደሆነና በአንድ ወይም በሁለት ቀናት ይጠፋል።

በአንዳንድ ሰዎች ላይ ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ከሌሎች ክትባቶች ጋር ሲነጻጸር በበለጠ እንደ ኢንፍሎዌንሻ/ፍሎ የመሰለ ምልክት እንደሚፈጠር፤ ይህም እስኪጠፋ ድረስ ጥቂት ጊዜ ሊወስድ ይችላል። እነዚህ የህመም ምልክቶች የሚፈጠሩት ከሁለተኛ መጠን እቅን ክትባት ጋር ሲወዳደር ከሰባት በጣም የተለመደው በመጀመሪያ መጠን ክትባት ይሆናል።

መርፌ በተወጉበት ቦታ ላይ ካመመዎት ወይም ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ በመጀመሪያ ከ1-2 ቀናት ትኩሳት፤ እራስ ምታት ወይም ሰውነት ማሳከክ ካለብዎት ፓራሰቲሞል/paracetamol የህመም ማስታገሻ መውሰድ ይችላሉ። ይህ ከዚህ በላይ ላሉት ምልክቶች እንዲቀንስ ይረዳሉ። ክትባቱን ከመውሰድዎ በፊት ፓራሰቲሞል/paracetamol ወይም ኢቡፕሮፊን/ibuprofen መውሰድ የለብዎም። መርፌውን በተወጉበት ቦታ እብጠት ካለ የቀዝቃዛ ጨርቅ ማሰሪያን መጠቀም ይችላሉ።

**AstraZeneca ኮቪድ/COVID-19 ክትባት ከወሰዱ በኋላ አልፎ አልፎ ለተከሰቱ ችግሮች የተደረገ ሪፖርት:**

- የአለርጂ መከሰት (አለመስማማት/anaphylaxis):
  - የAstraZeneca ኮቪድ/COVID-19 ክትባት ከወሰዱ በኋል የሚፈጠር አለመስማማት/ Anaphylaxis በጣም አነስተኛ ነው። በአውስትራሊያ ውስጥ የሚታየው መጠን ከሌሎች ክትባቶች ጋር ተመሳሳይ ይመስላል።
- ትሮምቦፕላትሌት ከትሮምቦችሮቶፕኒያ በሽታ ምልክት/(TTS) የተባለ ሁኔታ ላለበት የደም መርጋት (thrombosis) እና አነስተኛ ፕላቲሌት/platelet ደረጃ (thrombocytopenia) ሊከሰት ይችላል:
  - ከአውስትራሊያና ውጭ አገራት መረጃ የሚያሳዩው ለTTS የመከሰት ቁጥር አነስተኛ መጠን እንደሆነ ነው
  - የደም መርጋት በተለያዩ ሰውነት አካል ሊፈጠር ሲችል፤ ይህም አንጎልን ያካትታል (ይህ የሰራብራል ቮኑስ ሳይነስ ትሮምቦሲስ/cerebral venous sinus thrombosis) እና የአብደመን/abdomen ሲባል (ይህ idiopathic splanchnic vein thrombosis ተብሎ ይጠራል)። አነስተኛ የደም ፕላቲሌት ቁጥር/platelet ለመድማት ምክንያት ሊሆን ይችላል።
  - የዚህ ሁኔታ በሽታ ምልክት የሚፈጠረው ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ከ4 እስከ 42 ቀናት ባለው ጊዜ ነው።
  - የዚህ ዓይነት ሁኔታ ያለባቸው ሰዎች በጣም ስለሚያማቸው ወደ ሆስፒታል መሄድ አለባቸው። ይህ ሁኔታ ለረጅም ጊዜ የአካል ጉዳለት እና ለሞትም ሊያዳርግ ይችላል።
  - ስለ TTS የበለጠ መረጃን ማግኘት የሚቻለው በታካሚ የመረጃ ጽሁፍ ወረቀት/Patient information sheet በ[AstraZeneca COVID-19 vaccine እና በ TTS ላይ ማግኘት ይቻላል](#)።

**ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ከዚህ በታች ያሉት ካለብዎት ህክምና ማግኘት አለብዎት:**

- የአለርጂ አለመስማማት ችግር አለብኝ ብለው ካሰቡ። ከባድ ችግር ካጋጠመዎት እንደ የመተንፈስ ችግር፤ ከትንሳሽ እጥረት ድምጽ፤ ፈጣን የልብ ትርታ ወይም እራስን የመሳት ችግር ካጋጠመዎት በ 000 መደወል።
- ክትባቱ ከወሰዱ ከጥቂት ቀናት በኋላ ሊጠፋ ባልቻለ የተከሰተ ችግር ካጋጠመዎት ይሆናል።
- በተለይ ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ከ4 እስከ 48 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ ከዚህ በታች ያሉት የበሽታ ካለብዎት:
  - ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ከ48 ሰዓታት በላይ ወይም ከ48 ሰዓታት በኋላ ከባድ የማይጠፋ እራስ ምታት ካለብዎት ነው። በመጀመሪያ ቀላል የህመም ማስታገሻው የራስ ምታቱን ሊያባብሰው ይችል ይሆናል ነገር ግን ይረጋጋል
  - የብሽጥ እይታ
  - የክንድና የፊት መዳከም
  - መደናገር ወይ የአእምሮ መሳት/seizure።
  - የትንፋሽ እጥረት
  - የደረት/ሳንባ ህመም
  - የማያቋርጥ የሆድ እቃ ህመም
  - የእግር ማበጥ
  - ብክለት ባለበት ቦታ ላይ ሳይሆን የሸፍታ ወይም ጠባሳ ለመግለጽ የማይቻል ችግር ካለ ነው።

በቅርቡ ክትባቱን እንደወሰዱ ለሀኪምዎ ማሳወቅ ማረጋገጥ። አስቸኳይ ላልሆነ የበሽታ ምልክቶች ለመደበኛ የጤና ጥበቃ አቅራቢዎ (ለርስዎ አጠቃላይ ሀኪም/GP) ማየት ይችላሉ።

## ለክትባት ደህንነት መቅከታተል እና ለሚከሰት ችግር ሪፖርት ስለማድረግ

ለሚከሰት የተጠረጠሩ ችግሮች ለርስዎ የበሽታ መከላከያ ክትባት አቅራቢ ወይም ለሌላ የጤና እንክብካቤ ባለሙያ ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ። ከዚያም እርስዎን በመወከል መደበኛ የሆነ ሪፖርት ለርስዎ አስተዳደር ግዛት ወይም ተራቶርይ የጤና መምሪያ ቢሮ ወይም በቀጥታ ለህክምና ጥራት አስተዳደር (TGA) ያቀርባሉ።

ይህንን በራስዎ ሪፖርት ለማድረግ ከፈለጉ፣ እባክዎ ለTGA በድረገጽ: <https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine> ላይ ማየትና በገጹ ላይ ያለን መመሪያ መከተል።

## ክትባት ከወሰዱ በኋላ የኮቪድ/COVID-19 ምርመራ ስለማካሄድ

ኮቪድ/COVID-19 ክትባት መውሰድ ጋር ከሚፈጠሩት አንዳንድ ችግሮች ኮቪድ/ COVID-19 ምልክቶች (ለምሳሌ፡ ትኩሳት) ጋር ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ የ AstraZeneca ኮቪድ/COVID-19 ክትባት ለማንኛውም ህይወት ላለው የ SARS-CoV-2 ቫይረስ እንደማያካትትና ለርስዎ በኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ ማጋለጥ እንደማይችል ነው። ለኮቪድ/COVID-19 ምርመራ ማካሄድ ወይም ከሌላ ሰው መገለል ላያስፈልግዎት ይችላል።

- ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ በመጀመሪያ ሁለት ቀናት ውስጥ አጠቃላይ የሆነ የበሽታ ምልክቶች እንደ ትኩሳት፣ የራስ ምታት ወይም የድካም መንፈስ ካለብዎት፣ እና
- ምንም ዓይነት የትንፋሽ ችግሮች መኖር እርግጠኛ ካልሆኑ (ለምሳሌ፡ በአፍንጫ ፈሳሽ ፣ መሳል፣ የጉሮሮ ህመም፣ የትንፋሽ ወይም የጣዕም ስሜት ማጣት) ከሌሉብዎት ነው።

ይሁን እንጂ በርስዎ አስተዳደር ግዛት/ተራቶርይ ላለው ወቅታዊ መመሪያዎች የተሰጡትን የቅርብ ጊዜ መረጃ ማጣራት አለብዎት። በርስዎ አካባቢዎች ውስጥ በሚካሄድ ድርጊት ላይ ለሚከሰት የኮቪድ/COVID-19 ወረርሽኝ በዚህ ምክር ሊቀይረው ይችላል። ሌሎችን ቅድመ ሁኔታዎች ቢያሟሉም አሁንም የኮቪድ/COVID-19 ምርመራ ማካሄድ ሊኖርብዎት ይችላል። ለምሳሌ፡ በታወቀ የኮቪድ/ COVID-19 ካለበት በቅርብ ግንኙነት ካደረጉ ነው። ጥርጣሬ ካለብዎት የህክምና ምርመራ ያስፈልጋል።

## ለሁለተኛው ቀጠሮዎ ማስታወስ

በ12 ሳምንታት ልዩነት ያለዎትን የሁለተኛ ጊዜ መጠን/doses AstraZeneca ኮቪድ/COVID-19 ክትባት መውሰዱ አስፈላጊ ነው። በክትባት መጠን/ doses መካከል ያለውን ልዩነት ከ12 ሳምንታት ወደ 4 ሳምንታት በታች ያለውን ልዩነትን በመቀነስ በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ትክክለኛ ሊሆን ይችላል። የሁለተኛ ጊዜ መጠን/dose ክትባት ኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ በተሻለ መከላከያ ዘዴ ሊሆን ይችላል።

## በርስዎ ቀጠሮ ላይ ያቀረቡት መረጃ እንዴት ይጠቅማል

እንዴት ስለርስዎ ግላዊ ዝርዝር መረጃ እንደሚወሰድ፣ እንደሚቀመጥ እና መጠቀም እንደሚችል መረጃ በድረገጽ <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations> ላይ ገብቶ ማየት።