



Australian Government



# AstraZeneca -koronavirusrokotuksen jälkeen

Viimeksi päivitetty: 30.7.2021

## Tietoa rokotteesta

Olet tänään saanut **COVID-19 Vaccine AstraZeneca** -rokotteen.

Tämä rokote voi estää sairastumisen koronavirustautiin. COVID-19 Vaccine AstraZeneca ei sisällä elävää SARS-CoV-2-virusta (koronavirustautia aiheuttavaa virusta), eikä se voi aiheuttaa koronavirustautia. Se sisältää SARS-CoV-2-viruksen tärkeän osan, piikkiproteiinin, geneettisen koodin, jonka vaaraton flunssaa "kantava" virus (adenovirus) kuljettaa soluihin. Kehosi valmistaa sitten piikkiproteiinia ja käyttää sitä oppiakseen tunnistamaan SARS-CoV-2-viruksen ja torjumaan sitä. Adenovirusta on muokattu niin, ettei se voi lisääntyä soluihin päästyään. Siksi se ei voi levitä muihin soluihin ja aiheuttaa infektoita.

## Mitä rokotuksen jälkeen on odotettavissa

Kuten kaikkien rokotusten, myös koronavirusrokotuksen jälkeen saattaa ilmetä häiritseviä vaikutuksia.

**Yleisiä** häiritseviä vaikutuksia **COVID-19 Vaccine AstraZeneca** -rokotteen jälkeen ovat:

- pistoskohdan kipu, turvotus, arkuus, punoitus tai kutina
- väsymys
- päänsärky
- lihaskipu
- pahoinvointi
- kuume ja vilunväristykset
- huonovointisuus
- nivelkipu.

**Harvinaisempia** häiritseviä vaikutuksia **COVID-19 Vaccine AstraZeneca**-rokotteen jälkeen ovat:

- suurentuneet imusolmukkeet
- pistosraajan kipu
- huimaus
- alentunut ruokahalu
- vatsakipu.

[health.gov.au/covid19-vaccines-languages](https://health.gov.au/covid19-vaccines-languages)

After your AstraZeneca COVID-19 Vaccination - 14082021 - Finnish

Nämä haittavaikutukset ovat yleensä lieviä. Noin kaksi kolmasosaa rokotetuista kokevat niitä. Ne alkavat vuorokauden kuluessa rokotuksesta ja menevät ohi parissa päivässä.

Jotkut saavat tästä rokotteesta merkittävämpiä flunssaa muistuttavia oireita kuin muista rokotteista ja saattavat tarvita lepoa tavanomaisesta toiminnastaan. Oireet ovat yleisempiä ensimmäisen annoksen jälkeen kuin toisen annoksen jälkeen.

Rokotuksen jälkeen ensimmäisten 1–2 päivän aikana ilmenevää pistoskohdan kipua, kuumetta, päänsärkyä tai muita särkyjä voi lääkittää parasetamolilla. Se auttaa vähentämään edellä mainittuja oireita. Parasetamolia tai ibuprofeenia ei tarvitse ottaa ennen rokotusta. Pistoskohdan turvotusta voi hoitaa kylmäpakkauksella.

**Harvinaisia COVID-19 Vaccine AstraZeneca** -rokotteen jälkeen raportoituja haittavaikutuksia ovat:

- Vakava allerginen reaktio (anafylaksia):
  - COVID-19 Vaccine AstraZeneca -rokotteen aiheuttama anafylaktinen reaktio on hyvin harvinainen. Australiassa sitä näyttää ilmenevän saman verran kuin muiden rokotteiden aiheuttamana.
- Hyytymishäiriö tromboottinen trombosytopeninen oireyhtymä (TTS), johon liittyy verisuonitukoksia (tromboosi) ja alhainen verihituleiden määrä (trombosytopenia):
  - Australiasta ja ulkomailta saatujen tietojen mukaan TTS on harvinainen
  - Verisuonitukokset voivat ilmetä eri puolilla kehoa, myös aivoissa (jossa sitä kutsutaan aivolaskimotukokseksi tai aivojen sinustromboosiksi) ja vatsan alueella (idiopaattinen vatsan alueen laskimotukos). Verihituleiden vähyys voi aiheuttaa verenvuotoa.
  - Hyytymishäiriön oireet alkavat tavallisesti noin 4–42 päivää rokotuksen jälkeen.
  - Hyytymishäiriöön sairastuneet ovat hyvin sairaita ja tarvitsevat sairaalahoitoa. Sairaus voi johtaa pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen tai jopa kuolemaan.
  - Lisätietoa TTS-hyytymishäiriöstä on [potilasohjeessa AstraZeneca-rokote ja TTS](#).

**Hakeudu lääkärin hoitoon rokotuksen jälkeen, jos:**

- Arvelet saaneesi allergisen reaktion. Soita 000, jos saat vakavia oireita, kuten hengitysvaikeuksia, hengityksen vinkumista, sydämentykytystä tai lyyhistryt.
- Rokotteen odotuksenmukainen haittavaikutus ei ole hävinnyt muutamassa päivässä.
- Saat seuraavia oireita, etenkin noin 4–42 päivää rokotuksen jälkeen:
  - päänsärkyä, joka jatkuu yli 48 tuntia rokotuksen jälkeen tai ilmenee myöhemmin kuin 48 tuntia rokotuksen jälkeen. Tavalliset särkylääkkeet voivat aluksi helpottaa päänsärkyä, mutta se jatkuu silti
  - näön sumentumista
  - kasvojen tai raajojen lihasheikkoutta
  - sekavuutta tai kouristuksia.
  - hengenahdistusta
  - rintakipua
  - pitkittynyttä vatsakipua
  - alaraajojen turvotusta
  - muun kuin pistoskohdan pistemäistä ihottumaa tai mustelmia, joille ei ole selitystä.

Muista kertoa lääkärille, että olet äskettäin saanut rokotteen. Kiireettömät oireet voi näyttää terveydenhuollon tarjoajalle, jonka luona tavallisesti käyt (yleensä oma lääkärisi).

## Rokoteturvallisuuden seuranta ja haittavaikutusten raportointi

Epäillyt haittavaikutukset voi ilmoittaa rokotuksen antajalle tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle. He laativat sitten puolestasi virallisen ilmoituksen asuinosavaltiosi tai -territoriosi terveysministeriölle tai suoraan Therapeutic Goods Administration -virastolle (TGA).

Jos haluat mieluummin ilmoittaa siitä itse, käy TGA:n sivustolla ja noudata sivulla annettuja ohjeita: <https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine>.

## Koronavirustestaus rokotuksen jälkeen

Jotkut koronavirusrokotuksen haittavaikutukset saattavat muistuttaa koronavirustaudin oireita (esim. kuume). COVID-19 Vaccine AstraZeneca -rokote ei kuitenkaan sisällä elävää SARS-CoV-2-virusta, eikä voi aiheuttaa koronavirustautia. Et ehkä tarvitse koronavirustestausta tai eristäytymistä, jos:

- saat yleisoireita, kuten kuumetta, päänsärkyä tai väsymystä kahden ensimmäisen päivän aikana rokotuksen jälkeen, ja
- olet varma, ettei sinulla ole hengitystieoireita (esim. nuha, yskä, kurkkukipu, hajuainin tai makuainin menetys).

Tarkista kuitenkin asuinosavaltiosi tai -territoriosi ajantasaiset ohjeet. Ohjeistus voi muuttua, jos asuinalueellasi ilmenee koronavirustautia. Saatat silti tarvita koronavirustestin, jos muut kriteerit täyttyvät, kuten jos olet tunnistetun koronavirustautitapauksen lähikontakti. Jos olet epävarma, hakeudu lääkäriin.

## Muista toinen rokotuskerta

On tärkeää saada kaksi COVID-19 Vaccine AstraZeneca -annosta, joiden välillä on noin 12 viikkoa. Rokotusten väliajan lyhentäminen 12 viikosta vähintään neljäksi viikoksi voi olla aiheellista tietyissä olosuhteissa. Toinen annos antaa paremman suojan koronavirustaudilta.

## Miten rokotuksessa antamiasi tietoja käytetään

Tietoa henkilötietojesi keräämisestä, tallentamisesta ja käyttämisestä on osoitteessa <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>