



Australian Government



Successivamente alla vaccinazione contro il COVID-19 con il vaccino di AstraZeneca

Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2021

Informazioni sul vaccino

Oggi avete ricevuto il **vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca**.

Questo vaccino può impedire che le persone si ammalino a causa del COVID-19. Il vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca non contiene alcun virus SARS-CoV-2 vivo (il virus che causa il COVID-19) e non può causare il COVID-19. Contiene il codice genetico di una parte importante del virus SARS-CoV-2 chiamata proteina spike che viene trasportata nelle cellule da un innocuo virus del raffreddore comune "portatore" (un adenovirus). Il corpo quindi crea la proteina spike e la utilizza per apprendere come riconoscere e combattere il virus SARS-CoV-2. L'adenovirus è stato modificato in modo da non potersi replicare una volta che è all'interno delle cellule. Questo significa che non può diffondersi ad altre cellule e causare un'infezione.

Cosa attendersi dopo la vaccinazione

Come per qualsiasi vaccino, potreste avere alcuni effetti collaterali dopo aver ricevuto un vaccino contro il COVID-19.

Gli effetti collaterali **comuni** del **vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca** includono:

- dolore, gonfiore, indolenzimento, rossore o prurito nel punto di iniezione
- stanchezza
- mal di testa
- dolore muscolare
- nausea
- febbre e brividi
- malessere
- dolore articolare.

health.gov.au/covid19-vaccines-languages

After your AstraZeneca COVID-19 Vaccination - 14082021 - Italian

Gli effetti collaterali **meno comuni** del **vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca** includono:

- gonfiore dei linfonodi
- dolore negli arti
- vertigini
- riduzione dell'appetito
- dolori di stomaco.

In genere tali effetti collaterali sono lievi. Avvengono in circa due terzi delle persone che vengono vaccinate, iniziano entro un giorno dalla vaccinazione e scompaiono entro uno o due giorni.

Alcune persone avranno sintomi influenzali più significativi dovuti a questo vaccino rispetto ad altri vaccini e potrebbero richiedere di avere del tempo lontano dalle normali attività. Questi sintomi sono più comuni dopo la prima dose rispetto alla seconda dose.

Se avete dolore nel punto di iniezione o febbre, mal di testa e dolori corporei nei primi 1–2 giorni dopo la vaccinazione, potete prendere del paracetamolo. Questo aiuta a ridurre alcuni dei sintomi di cui sopra. Non è necessario prendere paracetamolo o ibuprofene prima della vaccinazione. Se il punto di iniezione è gonfio potete utilizzare una compressa fredda.

Gli effetti collaterali **rari** riscontrati nel caso del **vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca** sono:

- Grave reazione allergica (anafilassi):
 - L'anafilassi è molto rara successivamente al vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca. La percentuale in Australia appare simile a quella di qualsiasi altro vaccino.
- Una condizione chiamata trombosi con sindrome da trombocitopenia (TTS), che comporta la coagulazione del sangue (trombosi) e bassi livelli di piastrine (trombocitopenia):
 - Le informazioni raccolte in Australia e all'estero dimostrano che la TTS è una condizione rara
 - I trombi possono verificarsi in diverse parti del corpo, fra cui il cervello (in questo caso si chiama trombosi del seno venoso cerebrale) e l'addome (in cui si chiama trombosi venosa splancnica idiopatica). Il basso livello di piastrine nel sangue può causare emorragie.
 - I sintomi di questa condizione hanno inizio da 4 a 42 giorni dopo la vaccinazione.
 - Le persone affette da questa condizione hanno sintomi molto gravi e devono recarsi in ospedale. Questa condizione può portare a disabilità di lungo termine e perfino alla morte.
 - Maggiori informazioni sulla TTS sono disponibili nel [Foglio informativo per i pazienti sul vaccino contro il COVID-19 e la TTS](#).

Successivamente alla vaccinazione dovrete rivolgervi a un medico se:

- Ritenete di avere una reazione allergica. Chiamate il 000 se avete sintomi gravi come la difficoltà a respirare, il rantolo, il battito cardiaco rapido o il collasso.
- Avete un effetto collaterale prevedibile del vaccino che non scompare dopo alcuni giorni.
- Avete uno dei seguenti sintomi, particolarmente da 4 a 42 giorni dopo la vaccinazione:
 - mal di testa che persiste oltre le 48 ore successive alla vaccinazione o che compare più tardi di 48 ore dopo la vaccinazione. Dei semplici antidolorifici potrebbero inizialmente alleviare il mal di testa, ma questo persiste
 - vista offuscata
 - debolezza del volto o degli arti

- confusione o convulsioni.
- difficoltà a respirare
- dolore al petto
- dolore addominale persistente
- gonfiore delle gambe
- sfoghi a punta di spillo o lividi lontani dal punto di iniezione che sono inspiegabili.

Assicuratevi di informare il vostro medico di aver recentemente ricevuto il vaccino. Per i sintomi non urgenti potete rivolgervi al vostro normale professionista sanitario (in genere il vostro medico di base).

Monitoraggio della sicurezza del vaccino e denuncia degli effetti collaterali

Potete denunciare gli effetti collaterali sospetti al vostro fornitore della vaccinazione o ad un altro professionista sanitario. Egli quindi sposterà una denuncia formale a vostro nome presso il ministero della sanità del vostro stato o territorio o direttamente alla Therapeutic Goods Administration (TGA).

Se preferite presentare denuncia voi stessi, visitate il sito web della TGA e seguite le istruzioni alla pagina: <https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccines>.

Test per il COVID-19 successivamente alla vaccinazione

Alcuni effetti collaterali dovuti alla vaccinazione contro il COVID-19 potrebbero essere simili ai sintomi di COVID-19 (ad es. febbre). Tuttavia il vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca non contiene alcun virus SARS-CoV-2 vivo e non può causare il COVID-19. Potreste non dovervi sottoporre a test per il COVID-19 né isolarvi:

- se sviluppate sintomi generici come la febbre, il mal di testa o la stanchezza nei primi due giorni successivi alla vaccinazione e
- se siete sicuri di non avere alcun sintomo respiratorio (ad es. naso che cola, tosse, mal di gola, perdita dell'olfatto o perdita del gusto).

Tuttavia dovete verificare le linee guida attuali nel vostro stato/territorio per avere le informazioni più aggiornate. Questa raccomandazione può cambiare in caso di focolai di COVID-19 nella vostra area locale. Potreste comunque dovervi sottoporre a test per il COVID-19 se si verificano gli altri criteri, ad esempio se siete un contatto ravvicinato di un caso appurato di COVID-19. In caso di dubbi, rivolgetevi a un medico.

Ricordate il vostro secondo appuntamento

È importante che riceviate due dosi del vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca a circa 12 settimane di distanza. In alcune circostanze potrebbe essere appropriato abbreviare l'intervallo fra le dosi da 12 settimane a non meno di 4 settimane. La seconda dose fornisce una migliore protezione dal COVID-19.

Come vengono utilizzate le informazioni che fornite durante il vostro appuntamento

Per informazioni su come vengono raccolti, conservati e utilizzati i vostri dati personali, visitate <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>