



Australian Government



Após sua vacinação contra a COVID-19 com a AstraZeneca

Última atualização: 30 de julho de 2021

Sobre a vacina

Hoje você recebeu a **Vacina AstraZeneca contra COVID-19**.

Esta vacina pode evitar que as pessoas adoeçam com a COVID-19. A Vacina AstraZeneca contra COVID-19 não contém nenhum vírus SARS-CoV-2 (o vírus que causa a COVID-19) vivo, e não pode lhe transmitir a COVID-19. Ela contém o código genético de uma parte importante do vírus SARS-CoV-2 chamada proteína S, que é levada para dentro de suas células por um vírus “portador” inofensivo do resfriado comum (um adenovírus). Seu organismo produz, então, a proteína S e a usa para aprender a reconhecer e combater o vírus SARS-CoV-2. O adenovírus foi modificado para que não possa se replicar quando estiver dentro das células. Isto significa que ele não pode se espalhar para outras células e provocar infecção.

O que esperar após a vacinação

Assim como qualquer outra vacina, você pode ter alguns efeitos colaterais após receber a vacina contra COVID-19.

Os efeitos colaterais **comuns** após a **Vacina AstraZeneca contra COVID-19** incluem:

- dor, inchaço, sensibilidade, vermelhidão ou coceira no local da injeção
- cansaço
- dor de cabeça
- dor muscular
- náusea
- febre e calafrios
- indisposição
- dor nas articulações.

Efeitos colaterais **menos comuns** após a **Vacina AstraZeneca contra COVID-19** incluem:

- gânglios linfáticos aumentados
- dor no membro do corpo
- tontura
- diminuição do apetite
- dor de estômago.

health.gov.au/covid19-vaccines

After your AstraZeneca COVID-19 vaccination - 14082021 - Portuguese

Estes efeitos colaterais geralmente são leves. Eles ocorrem em aproximadamente dois terços das pessoas que foram vacinadas, começam um dia após a vacinação e passam dentro de um ou dois dias.

Após a vacinação, algumas pessoas terão sintomas parecidos com os da gripe mais acentuados, se comparados com outras vacinas, e talvez não possam realizar suas atividades normais por alguns dias. Tais sintomas são mais comuns após a primeira dose, em comparação com a segunda dose.

Se tiver dor no local da injeção, febre, dor de cabeça ou dores do corpo durante 1 ou 2 dias após a vacinação, pode tomar paracetamol. Isto ajuda a diminuir os sintomas acima. Você não precisa tomar paracetamol nem ibuprofeno antes da vacinação. Se houver inchaço no local da injeção, pode usar uma compressa fria.

Estes são os efeitos colaterais **raros** que foram relatados após a **Vacina AstraZeneca contra COVID-19**:

- Reação alérgica grave (anafilaxia):
 - Anafilaxia após a Vacina AstraZeneca contra COVID-19 é muito rara. O índice na Austrália parece ser semelhante ao de qualquer outra vacina.
- Uma condição chamada síndrome de trombose com trombocitopenia (TTS), que envolve coágulos sanguíneos (trombose) e níveis baixos de plaquetas sanguíneas (trombocitopenia):
 - Dados na Austrália e no exterior mostram que a TTS é uma condição rara
 - Os coágulos sanguíneos podem ocorrer em várias partes do corpo, inclusive no cérebro (isto é chamado de trombose do seio venoso cerebral) e no abdômen (isto é chamado de trombose venosa esplâncnica idiopática). O nível baixo de plaquetas sanguíneas pode causar sangramento.
 - Os sintomas desta condição ocorrem por volta do 4º ao 42º dia após a vacinação.
 - Pessoas com esta condição ficam muito doentes e precisam ir ao hospital. Esta condição pode levar a uma deficiência a longo prazo e até mesmo à morte.
 - Mais informações sobre a TTS podem ser encontradas na [Folha informativa para o paciente sobre a Vacina AstraZeneca contra COVID-19 e a TTS](#).

Você deve procurar atendimento médico após a vacinação se:

- Achar que está tendo uma reação alérgica. Ligue para 000 se tiver sintomas graves, como por exemplo: dificuldade para respirar, respiração ofegante, batimento cardíaco acelerado ou desmaio.
- Tiver um efeito colateral esperado da vacina que não tenha passado depois de alguns dias.
- Tiver algum dos sintomas seguintes, principalmente por volta do 4º ao 42º dia após a vacinação:
 - dor de cabeça que continua além de 48 horas após a vacinação, ou que aparece depois de 48 horas após a vacinação. Analgésicos simples podem inicialmente aliviar a dor de cabeça, mas ela continua
 - visão turva/embaçada
 - fraqueza na face ou nos membros
 - convulsões ou sensação de confusão.
 - falta de ar
 - dor no peito
 - dor abdominal persistente
 - inchaço na perna
 - pequenas erupções ou manchas na pele, fora do local da injeção, que não tenham explicação.

Não se esqueça de contar ao médico que recebeu recentemente a vacina. Para sintomas não urgentes, você pode ir até seu provedor de cuidados de saúde regular (geralmente seu Clínico Geral - GP).

Monitorando a segurança da vacina e relatando efeitos colaterais

Você pode relatar suspeitas de efeitos colaterais ao seu provedor de vacinação ou a outros profissionais da saúde. Eles farão, então, um relato formal em seu nome para o departamento de saúde de seu estado ou território, ou diretamente para a Administração de Produtos Terapêuticos (TGA).

Se preferir relatar você mesmo, por favor, visite o site da TGA, e siga as instruções contidas na página: <https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine>.

Teste para COVID-19 após a vacinação

Alguns efeitos da vacinação contra COVID-19 podem ser parecidos com os sintomas da COVID-19 (febre, por exemplo). No entanto, a Vacina AstraZeneca contra COVID-19 não contém nenhum vírus SARS-CoV-2 vivo e não pode causar a COVID-19. Talvez não precise fazer o teste para COVID-19 nem se isolar:

- se apresentar sintomas gerais, como febre, dor de cabeça ou cansaço nos primeiros dois dias após a vacinação, e
- se tiver certeza de que não está com nenhum sintoma respiratório (nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, perda de olfato ou perda de paladar, por exemplo).

No entanto, deve verificar as orientações atuais em seu estado/território para saber as últimas informações. Estas instruções podem mudar no caso de um surto de COVID-19 em sua região. Você talvez ainda precise fazer o teste para COVID-19 se atender a outros critérios, como, por exemplo, se for contato próximo de um caso conhecido de COVID-19. Se estiver em dúvida, busque uma avaliação médica.

Lembre-se de sua segunda consulta

É importante que receba duas doses da Vacina AstraZeneca contra COVID-19, com um intervalo de umas 12 semanas entre elas. Encurtar o intervalo de 12 semanas para um intervalo não menor que 4 semanas entre as doses pode ser apropriado em certas situações. A segunda dose lhe dará maior proteção contra a COVID-19.

Como são usadas as informações que você fornece em sua consulta

Para informações sobre como seus dados pessoais são coletados, armazenados e usados, visite <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>