



Australian Government



Después de su vacunación del COVID-19 - AstraZeneca

Última actualización: 30 de julio de 2021

Acerca de la vacuna

Hoy se vacunó con la **vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca**.

Esta vacuna puede evitar que las personas se enfermen por el COVID-19. La vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca no contiene ningún virus SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19) vivo y no puede contagiarse el COVID-19 por ella. Contiene el código genético de una parte importante del virus SARS-CoV-2 llamada proteína de espiga que es transportada a sus células por un virus «portador» de un resfrío común e inofensivo (un adenovirus). Luego, su cuerpo produce la proteína de espiga y la utiliza para aprender a reconocer y luchar contra el virus SARS-CoV-2. El adenovirus fue modificado para que no pueda replicarse una vez que esté dentro de las células. Esto significa que no puede propagarse a otras células y causar infección.

Qué esperar después de la vacunación

Al igual que con cualquier vacuna, puede tener algunos efectos secundarios después de vacunarse contra el COVID-19.

Entre los efectos secundarios comunes después de la aplicación de la **vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca** se encuentran:

- dolor, hinchazón, sensibilidad, enrojecimiento o picazón en el lugar de la inyección
- cansancio
- dolor de cabeza
- dolor muscular
- náuseas
- fiebre y escalofríos
- malestar
- dolor en las articulaciones.

Entre los efectos secundarios menos comunes después de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca se encuentran:

- ganglios linfáticos agrandados
- dolor en las extremidades
- mareos
- disminución del apetito
- dolor de estómago.

Estos efectos secundarios suelen ser leves. Se producen en alrededor de dos tercios de las personas vacunadas, comienzan dentro del día siguiente a la vacunación y desaparecen dentro de uno o dos días.

Algunas personas tendrán síntomas más significativos similares a los de la gripe después de recibir esta vacuna en comparación con otras vacunas, y es posible que necesiten ausentarse de sus actividades normales. Dichos síntomas son más comunes después de la primera dosis en comparación con la segunda dosis.

Si tiene dolor en el lugar de la inyección, fiebre, dolor de cabeza o dolores corporales en los primeros 1 a 2 días después de la vacunación, puede tomar paracetamol. Lo ayuda a reducir algunos de los síntomas anteriores. No necesita tomar paracetamol o ibuprofeno antes de la vacunación. Si tiene hinchazón en el sitio de la inyección, puede usar una compresa fría.

Entre los efectos colaterales infrecuentes notificados después de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca se encuentran:

- Reacción alérgica grave (anafilaxia):
 - La anafilaxia después de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 es muy rara. La tasa en Australia parece ser similar a la de cualquier otra vacuna.
- Una afección llamada trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS), que consiste en la formación de coágulos (trombosis) y niveles bajos de plaquetas (trombocitopenia):
 - La información de Australia y del extranjero demuestra que la TTS es una afección rara
 - Los coágulos de sangre se pueden producir en diferentes partes del cuerpo, incluidos el cerebro (esto se llama trombosis de senos venosos cerebrales) y el abdomen (esto se llama trombosis venosa esplácnica idiopática). El nivel bajo de plaquetas en sangre puede producir hemorragias.
 - Los síntomas de esta enfermedad ocurren alrededor de 4 a 42 días después de la vacunación.
 - Las personas con esta enfermedad se sienten muy mal y necesitan ir al hospital. Esta enfermedad puede ocasionar discapacidad a largo plazo y hasta la muerte.
 - Hay más información disponible sobre la TTS en la [Hoja informativa para el paciente acerca de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 y la TTS](#).

Debería buscar atención médica después de la vacunación si:

- Piensa que tiene una reacción alérgica. Llame al 000 si tiene síntomas graves, como dificultad para respirar, sibilancia, latidos cardíacos rápidos o desmayo.
- Tiene un efecto secundario esperado de la vacuna que no desapareció después de algunos días.
- Tiene alguno de los siguiente síntomas, especialmente alrededor de 4 a 42 días después de la vacunación:
 - dolor de cabeza que persiste más allá de las 48 horas posteriores a la vacunación, o que aparece más tarde de las 48 horas posteriores a la vacunación. Los analgésicos simples pueden aliviar el dolor de cabeza inicialmente, pero persiste
 - visión borrosa

- debilidad en la cara o las extremidades
- confusión o convulsiones.
- dificultad para respirar
- dolor de pecho
- dolor abdominal persistente
- hinchazón en las piernas
- sarpullido de puntos rojos o moretones lejos del sitio de la inyección que no se pueden explicar.

Asegúrese de decirle a su médico que fue vacunado recientemente. Por los síntomas que no son urgentes, puede consultar a su médico habitual (generalmente su médico de cabecera).

Supervisión de la seguridad de las vacunas y notificación de efectos secundarios

Puede notificar sospechas de efectos secundarios a su proveedor de vacunación o a otro profesional de la salud. Luego, ellos harán un informe formal en su nombre para el departamento de salud de su estado o territorio o directamente para la Administración de Artículos Terapéuticos (TGA).

Si prefiere notificar usted mismo, visite el sitio web de la TGA y siga las instrucciones en la página: <https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine>.

Prueba del COVID-19 después de la vacunación

Es posible que algunos efectos secundarios de la vacunación contra el COVID-19 sean similares a los síntomas de COVID-19 (p. ej. fiebre). Sin embargo, la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca no contiene ningún virus SARS-CoV-2 vivo y no puede causar COVID-19. Puede que no necesite hacerse una prueba del COVID-19 o aislarse:

- si presenta síntomas generales como fiebre, dolor de cabeza o cansancio en los primeros dos días después de la vacunación, y
- está seguro de que no tiene síntomas respiratorios (por ejemplo: secreción nasal, tos, dolor de garganta, pérdida del olfato o pérdida del gusto).

De todos modos, debería consultar las pautas actuales en su estado/territorio para obtener la información más actualizada. Estas recomendaciones pueden cambiar en caso de que se produzca un brote de COVID-19 en su área local. Es posible que aún necesite hacerse una prueba de COVID-19 si cumple con otros criterios, por ejemplo, si es un contacto cercano de un caso de COVID-19 conocido. En caso de duda, busque asesoramiento médico.

Recuerde su segundo turno

Es importante que reciba dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca, con alrededor de 12 semanas de diferencia. En determinadas circunstancias, puede ser apropiado acortar el intervalo de 12 semanas a no menos de 4 semanas entre dosis. La segunda dosis le proporcionará mejor protección contra el COVID-19.

Cómo se utiliza la información que usted proporciona en su cita

Para obtener información acerca de cómo se recopilan, guardan y utilizan sus datos personales, <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>