



Australian Government

# COVID-19 VACCINATION

## አስትራዘነካ/AstraZeneca መረጃ

### አስትራዘነካ/AstraZeneca ክትባት

በአስትራዘነካ/AstraZeneca ክትባት እና በጣም ትንሽ የሆነ ችግር ሁኔታ መካከል ግንኙነት እንዳለ፤ ይህም የደም መርጋትና ትንሽ የደም ፕላተሌት/platelet ደረጃ መቀነስ ይሆናል። ይህ ሁኔታ ትሮምቦሲስ/Thrombosis ክትሮስይቶፕሲስ ስይንድሮም/thrombocytopenia syndrome (TTS) ህግም ምልክቶች ጋር ተብሎ ይጠራል።

ለኮቪድ/COVID-19 ክትባት ሁሉም ጎልማሶች እንዲወስዱት ይመከራል። እድሜያቸው ከ60 ዓመት በታች ለሆኑ የኮቪድ/COVID-19 መከላከያ ፕፊዘር/Pfizer ክትባትን እንዲወስዱ ይመረጣል። ይሁን እንጂ እድሜያቸው ከ60 ዓመት በታች ለሆኑ አሁንም ለአስትራዘነካ/AstraZeneca ክትባት መውሰድ በእነሱ ምርጫ ይሆናል። ውሳኔ ለማድረግ እንዲረዳዎ ሀኪምዎን ማነጋገር ነው።

የአስትራዘነካ/AstraZeneca ክትባት የሚሰጠው እድሜያቸው 60 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑት ሰዎች ነው።

### ሮምቦሲስ/Thrombosis ክትሮስይቶፕሲስ ዝግመት ህግም/thrombocytopenia syndrome (TTS በሚል የሚጠራ) ምንድን ነው?

ትሮምቦሲስ/Thrombosis ማለት የደም መቆም ማለት ነው።

ትሮስይቶፕሲስ ስይንድሮም/thrombocytopenia syndrome ማለት አነስተኛ የደም ፕላተሌት ደረጃ መጠን ነው።

TTS በአስትራዘነካ/AstraZeneca ይሊከሰት የሚችል በጣም አነስተኛ የሆነ ችግር ነው። ይህ ከተፈጠረ በጣም ከባድ የሰውነት አካል ጉዳት ሊያመጣ ይችላል። TTS ለደም መርጋት ችግር ምክንያት ሊሆን ሲችል፤ ይህም በተለያዩ የሰውነት አካል ላይ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ለደም ፕላተሌት መጠን ማነስ ምክንያት ሊሆን ይችላል፤ ይህም ለደም መፍሰስ ችግር ሊያመጣ ይችላል።

### መቶ ነው የTTS የሚከሰተው?

ለTTS መፈጠር ጉዳይ ሪፖርት የተደረገው ይህን ክትባት መውሰድ ከተጀመረ በኋላ ከ 4 እስከ 42 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ እንደሆነ እና አብዛኛው የመጀመሪያ መጠን/dose አስትራዘነካ/AstraZeneca ክትባት ከተወሰደ በኋላ ነው።

### TTS ምን ያህል የተለመደ ነው?

TTS በጣም ያልተለመደ ነው። በአሁን ጊዜ ችግር ካለባቸው የተገመተው ለአስትራዘነካ ኮቪድ/AstraZeneca COVID-19 ክትባት ከወሰዱት ከ100,000 ሰዎች ውስጥ 1-2 ሰዎች የሚሆኑት ችግር እንደደረሰባቸው ነው። ነገር ግን እድሜያቸው ከ60 ዓመት በታች በሆኑት ላይ ከፍተኛ እንደሆነ፤ ይህም ከ100,000 ሰዎች ውስጥ በግንት 2-3 ሰዎች የሚሆኑት ሰዎች ችግር እንዳለ ነው። በእነዚህ ግምቶች ለበለጠ መረጃ በማግኘት ወቅታዊ ይሆናል።

### የሆኑ ቡድኖች በTTS ላይ ለበለጠ ችግር ያጋልጣሉ?

ምንም እንኳን TTS በአንዳንድ የእድሜ አንጋፋ ጎልማሳ ሰዎች ላይ ችግሩ እንዳለ ሪፖርት ቢደረግም፤ ነገር ግን በታዳጊ ጎልማሶች ላይ እንደሚታይ ነው። ለደም መርጋት አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችል የሆነ ቅድመ ህክምና መድሃኒት እንደነበረ እናውቅም። ተመራማሪዎች ለዚህ እያጣሩ ነው።

**የTTS በሽታ ምልክቶች ምንድን ናቸው?**

TTS ለሚከተሉት አንዳንድ የበሽታ ምልክቶች ሊፈጠር ይችላል ይሆናል:

- ሃይለኛ ማለይቆም የራስ ምታት፤ ይህም:
  - ከከትባት መውሰድ በኋላ ቢያንስ ለ2 ቀናት ሊፈጠር ይችላል
  - በቀላሉ ብህመም ማስታገሻ መድሃኒት የማይሻሻል
  - በምትተኛበት ጊዜ ሊብስ ይችላል
- ማቅለሽለሽ ወይም ማስታወክ
- በግልጽ የማይታይ መደብዘዝ
- ለመናገር ችግር
- እንቅልፍ እንቅልፍ ማለት
- በድንገት አእምሮ መሳት
- የመተንፈስ ችግር
- የደረት ህመም
- የውስጥ እግር ማበጥ
- የማያቋርጥ የሆድ እቃ ህመም
- መርፌ ከወሰዱ በኋላ በቆዳ ውስጥ ትንሽ ደም መቁጠር።

እርስዎ ወይም ሌላ ሰው ለኮቪድ/ COVID-19 ከትባት ከወሰዱ በኋላ ከነዚህ ከባድ ችግሮች የሆነ ከተፈጠረ፤ በቀጥታ በስልክ 000 አድርጎ መደወል ይችላሉ።

**የአስትራዘነካ/ AstraZeneca ከትባቶች ጥቅም ከሚፈጥረው ችግር የበለጠ ነው?**

አዎ፤ ከትባት በመውሰድ የሚገኘው ጥቅም ከሚከሰተው ችግር የበለጠ እንደሆነ፤ በተለይ ደግሞ በእድሜ አንጋፋ ለሆኑ ሰዎች በኮቪድ/ COVID-19 የመያዝ ከተኛ ችግር ላለባቸው ነው።

**እድሜዎት ከ 60 ዓመት በታች ከሆነ እና ለመጀመሪያው መጠን/ dose የአስትራዘነካ/ AstraZeneca ከትባት ለመውሰድ ቀጥሮ ከያዙ ምን ማድረግ ይኖርብዎታል?**

እርስዎ የመጀመሪያ መጠን/ dose አስትራዘነካ/ AstraZeneca ከትባት ለመውሰድ ቀጠሮ ካስያዙ እና እድሜዎት ከ60 ዓመት ለሀኪም ማነጋገር። ከትባቱን ለመውሰድ ወይም ላለመውሰድ ለመወሰን ሀኪምዎ ይረዱዎታል።

**እርስዎ የመጀመሪያ መጠን/ dose የአስትራዘነካ/ AstraZeneca ከትባት ከወሰዱ በኋላ የሁለተኛ መጠን/ dose ከትባት ጊዜ ከደረሰ ምን ማድረግ ይኖርብዎታል?**

የTTS ስለመፈጠሩ ጉዳዮች በሙሉ ሪፖርት የተደረገው ለመጀመሪያው መጠን/ dose የአስትራዘነካ ኮቪድ/ AstraZeneca COVID-19 ከትባት ከተወሰደ በኋላ ነው። ለመጀመሪያው መጠን/ dose የአስትራዘነካ ኮቪድ/ AstraZeneca ከትባት ከተወሰደ በኋላ ከባድ ችግር ካፈጠረብዎት፤ ታዲያ ምንም እንኳን እድሜዎት ከ60 ዓመት በታች ቢሆንም ለሁለተኛው መጠን/ dose ከትባት ለመውሰድ እምነት ሊያሳድርብዎት ይችላል።

**ቀደም ሲል የደም መርጋት ችግር ለነበረባቸው ሰዎች የአስትራዘነካ/ AstraZeneca ከትባት መውሰዱ ደህንነቱ የተጠበቅ ነው?**

ቀደም ሲል ሌላ ዓይነት የደም መርጋት ችግር ከነበረብዎት ወይም በደም መርጋት ችግር ጫፍ ላይ ቢኖሩም የአስትራዘነካ/ AstraZeneca ከትባት መውሰድ ግን ይችላሉ። የአስትራዘነካ/ AstraZeneca ከትባት በመውሰድ ቀጥሎ የ TTS ችግር በመፍጠር ላይ ቀደም ሲል የደም መርጋት የሚያሳይ ማስረጃ የለም።

**ለበለጠ መረጃ**

ስለ አስትራዘነካ/ AstraZeneca ከትባት ጥያቄዎች ካለዎት፤ ሀኪምዎን ማነጋገር፤ በድረገጽ [www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages](http://www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages) ላይ ገብቶ ማየት ወይም ለአገር አቀፍ ኮሮናቫይረስ እርዳታ መስመር በስልክ 1800 020 080 መደወል። ለትርጉማ አስተርጓሚ አገልግሎቶች በስልክ 131 450 አድርጎ መደወል።