



AstraZeneca 疫苗须知

阿斯利康疫苗

阿斯利康疫苗 (AstraZeneca) 与一种罕见的病症之间存在联系。这种病症表现为血栓形成和血小板水平低下。这种病症称为血栓性血小板减少症综合征 (TTS)。

建议所有成年人接种新冠疫苗。辉瑞 (Pfizer) 疫苗是 60 岁以下成年人的首选新冠疫苗。但 60 岁以下的成年人仍可选择接种阿斯利康疫苗。如需帮助做出决定，请咨询医生。

阿斯利康疫苗将提供给年满 60 岁的人群。

什么是血栓性血小板减少症综合征 (TTS) ?

血栓形成意味着有血块凝结。

血小板减少症意味着血小板水平低下。

TTS 是阿斯利康疫苗一种罕见的潜在副作用。一旦出现了 TTS，后果可能很严重，可能导致残疾或死亡。TTS 会导致血栓，可能出现在身体的不同部位。TTS 还可能导致血小板水平低下，从而导致出血。辉瑞疫苗和 TTS 之间没有关联。

TTS 会在什么时候发生?

根据报告病例，TTS 发生在疫苗接种后的 4 至 42 天之间，通常是在接种第一剂阿斯利康疫苗后。

TTS 有多常见?

目前估计，在接受阿斯利康新冠疫苗的人中，每 10 万人中大约有 1-2 人受到 TTS 的影响。但对于 60 岁以下的人来说，该比率估计会较高，约为每 10 万人中有 2-3 人。随着更多信息的出现，这一估算比例将进行相应的更新。

是否有任何群体出现 TTS 的风险较高?

尽管出现过一些老年人病例，但 TTS 在年轻成年人人群中似乎更常见。我们目前尚不知道是否有任何基础病可能导致血栓形成。研究人员目前正在着手调查。

TTS 的症状是什么？

TTS 可能会导致以下一些症状：

- 严重持续的头痛：
 - 在疫苗接种至少 2 天后出现
 - 简单的止痛药无法缓解
 - 躺下时情况可能会更糟
- 恶心和呕吐
- 视力模糊
- 说话困难
- 嗜睡
- 癫痫发作
- 呼吸困难
- 胸痛
- 腿部肿胀
- 持续胃痛
- 注射部位周边皮下有小血点。

如果您或其他人在接种新冠疫苗后经受这些严重的副作用，则应立即致电 000。

接种阿斯利康疫苗的好处是否大于风险？

是的。疫苗接种的好处大于风险，特别是对于患染新冠疾病风险较高的老年人来说。

如果未满 60 岁但却预订了接种第一剂阿斯利康，那该怎么办？

如果已预订接种第一剂阿斯利康疫苗，而且年龄在 60 岁以下，则请咨询医生。医生将帮助您决定是否接种阿斯利康疫苗。

如果已接种了第一剂阿斯利康疫苗，而且到了该接种第二剂疫苗的时候，那该怎么办？

几乎所有的 TTS 报告病例都发生在接种第一剂阿斯利康新冠疫苗之后。如果在接种第一剂阿斯利康疫苗后没有出现严重的副作用，即使未满 60 岁，也可放心接种第二剂疫苗。

阿斯利康疫苗对于过去有过血栓形成病史的人来说是安全的吗？

如果曾有过其他类型的血栓，或者有血栓形成的风险，则仍可接种阿斯利康疫苗。目前没有证据表明，有血栓病史会增加接种阿斯利康疫苗后出现 TTS 的风险。

欲了解更多信息

若对阿斯利康疫苗有疑问，请咨询医生，浏览 www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages，或者拨打全国冠状病毒帮助热线 1800 020 080。如需口笔译服务，请致电 131 450 。