



COVID-19 VACCINATION

阿斯利康(AstraZeneca)資訊

阿斯利康 (AstraZeneca) 疫苗

阿斯利康(AstraZeneca)疫苗與一個罕見的病症有關聯。這個病症涉及血栓和低血小板水平，稱為血栓性血小板減少綜合症(Thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS)。

我們建議所有成年人接種 COVID-19 疫苗。輝瑞(Pfizer)疫苗是 60 歲以下成年人抵禦 COVID-19 的首選疫苗。然而，60 歲以下成人仍然可以選擇接種阿斯利康疫苗。與您的醫生商談有助您作出決定。

60 歲和以上人士將接種阿斯利康疫苗。

什麼是血栓性血小板減少綜合症 (TTS) ?

血栓是指血塊。

血小板減少症是指低血小板水平。

TTS 是阿斯利康疫苗的一種罕見、潛在的副作用。若出現此副作用，情況可能很嚴重，並可能導致殘疾或死亡。TTS 會引起血栓，可以出現在不同身體部位。TTS 也可以導致低血小板水平，造成出血。

什麼時候會發生 TTS?

TTS 的報告病例是發生在接種疫苗後的 4 至 42 天，通常是接種第一劑阿斯利康疫苗後。

TTS 常見嗎?

TTS 很罕見。目前估計每 100,000 名接受阿斯利康 COVID-19 疫苗的人中約有 1-2 人受影響。但對於 60 歲以下人士比率較高，估計每 100,000 人中約有 2-3 人。隨著我們獲得更多資訊，這些估計亦會更新。

是否有其任何群組更容易出現 TTS?

儘管有報告指出一些較年長的成人也有 TTS，然而此病症似乎在年輕成年人中較常見。我們不知道是否有任何本身已有的病患可能會導致血栓。研究人員正循這一點調查。

TTS 的徵狀是什麼?

TTS 可能會有下列徵狀：

- 持續嚴重頭痛，其：
 - 在接種疫苗後至少 2 天才出現
 - 在服用簡單止痛藥物後不能改善
 - 在躺下時可能會更嚴重

- 噁心和嘔吐
- 視力模糊
- 說話困難
- 昏昏欲睡
- 癲癇
- 呼吸困難
- 胸口痛
- 腿部腫脹
- 持續胃痛
- 在注射部位以外地方出現皮下小血斑。

若您或其他人在接種 COVID-19 疫苗後出現這些嚴重副作用，您應立即致電 000。

阿斯利康疫苗的益處是否大於其風險？

是。接種疫苗的益處比風險更大，尤其是對於那些有較高風險因 COVID-19 而患重病的長者。

若您未滿 60 歲已預訂約接種第一劑阿斯利康疫苗，該怎麼辦？

若您已預約接種第一劑阿斯利康疫苗而未滿 60 歲，請諮詢您的醫生。他們會幫助您決定是否應接種疫苗。

若您已經接種了第一劑阿斯利康疫苗，並即將要接種第二劑，該怎麼辦？

幾乎所有 TTS 的報告病例均發生於接種第一劑阿斯利康疫苗之後。若您在接種第一劑阿斯利康疫苗後沒有嚴重副作用，即使您未滿 60 歲亦可以放心接種第二劑疫苗。

阿斯利康疫苗對過去曾患有血栓症的人是否安全？

若您過其曾患有其他類型的血栓症或有血栓風險，您仍然可以接種阿斯利康疫苗。沒有證據顯示先前有血栓問題會增加接種阿斯利康疫苗後出現 TTS 的風險。

更多資料

若您對阿斯利康疫苗有任何疑問，請諮詢您的醫生、瀏覽 www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages 或致電國家冠狀病毒求助熱線(National Coronavirus Helpline)，電話：1800 020 080。如需翻譯和口譯服務，請致電 131 450。