



## اطلاعات درباره استرازنکا

### واکسن استرازنکا

رابطه ای بین واکسن استرازنکا و حالت نادری وجود دارد که شامل لخته شدن خون و سطح پایین پلاکت خون می شود. این حالت ترومبوز با سندرم ترومبوسیتوپنی (TTS) نامیده می شود.

واکسیناسیون کووید-19 برای همه بزرگسالان توصیه می شود. واکسن فایزر واکسن ترجیحی در مقابل کووید-19 برای بزرگسالان زیر 60 سال است. با این حال، بزرگسالان زیر 60 سال ممکن است هنوز هم انتخاب کنند که واکسن استرازنکا را دریافت کنند. برای کمک به تصمیم گیری تان، با پزشک خود صحبت کنید. واکسن استرازنکا به افراد 60 ساله و بالاتر زده خواهد شد.

### ترومبوز با سندرم ترومبوسیتوپنی (شناخته شده به نام TTS) چیست؟

ترومبوز به معنی لخته خون است.

ترومبوسیتوپنی به معنی پایین بودن سطح پلاکت خون است.

TTS یک عارضه جانبی نادر و بالقوه واکسن استرازنکا است. اگر این اتفاق بیفتد، می تواند موردی جدی باشد و باعث ناتوانی یا مرگ شود. TTS باعث لخته شدن خون می شود که می تواند در قسمت های مختلف بدن باشد. این حالت همچنین می تواند پایین بودن سطح پلاکت خون را ایجاد کند که ممکن است منجر به خونریزی شود. هیچ رابطه ای بین واکسن فایزر و TTS وجود ندارد.

### TTS چه زمانی اتفاق می افتد؟

موارد گزارش شده TTS بین 4 تا 42 روز پس از واکسیناسیون، معمولاً با اولین دوز واکسن استرازنکا اتفاق افتاده است.

### TTS چقدر رایج است؟

TTS نادر است. در حال حاضر تخمین زده می شود حدود 1 تا 2 نفر از صد هزار نفر که واکسن AstraZeneca COVID-19 را دریافت می کنند، تحت تأثیر قرار گیرند. برای کسانی که زیر 60 سال هستند، این میزان تخمین زده می شود که در حدود 2 تا 3 نفر در هر 100000 نفر بالاتر باشد. این تخمین ها با دسترسی به اطلاعات بیشتر، به روز خواهد شد.

### آیا هیچ گروهی بیشتر در معرض خطر TTS است؟

به نظر می رسد TTS در بزرگسالان جوانتر شایع تر است، اگر چه در برخی از بزرگسالان مسن گزارش شده است. ما نمی دانیم که آیا هیچ وضعیت پزشکی که از قبل وجود دارد، ممکن است بر لخته شدن خون تأثیر بگذارد یا نه. پژوهشگران در حال بررسی این موضوع هستند.

### علامت TTS چیست؟

TTS ممکن است برخی از علائم زیر را ایجاد کند:

- سردرد شدید مداوم که:
  - حداقل 2 روز پس از واکسیناسیون ظاهر می شود
  - با داروهای ساده تسکین درد بهبود نمی یابد

○ ممکن است هنگام دراز کشیدن بدتر شود

- حالت تهوع و استفراغ
- تاری دید
- مشکل در صحبت کردن
- خواب آلودگی
- تشنج
- دشواری تنفس
- درد قفسه سینه
- تورم در پاهایتان
- درد مداوم شکم
- لکه های کوچک خون زیر پوستی، دور از محل تزریق.

اگر شما یا فرد دیگری هر یک از این عوارض جانبی جدی را پس از واکسیناسیون کووید-19 داشته باشید، باید فوراً با 000 تماس بگیرید.

#### آیا مزایای واکسن استرازنکا بیشتر از خطرات آن است؟

بله. مزایای واکسیناسیون بیشتر از خطرات آن است، مخصوصاً برای افراد مسن که خطر بیشتر مریضی شدید کووید-19 برایشان وجود دارد.

#### اگر شما زیر 60 سال هستید و برای دریافت اولین دوز خود از استرازنکا رزرو کرده اید، چه می شود؟

اگر شما برای اولین دوز واکسن استرازنکا رزرو کرده اید و زیر 60 سال سن دارید، با پزشک خود صحبت کنید. او به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که آیا واکسن را دریافت کنید یا خیر.

#### اگر شما اولین دوز خود را از استرازنکا دریافت کرده اید و نوبت دریافت دوز دوم واکسن تان رسیده است، چه می شود؟

تقریباً تمام موارد گزارش شده از TTS پس از دریافت اولین دوز واکسن کووید-19 استرازنکا رخ داده است. اگر پس از اولین دوز واکسن استرازنکا عوارض جانبی شدیدی نداشتید، می توانید با اطمینان دوز دوم خود را دریافت کنید، حتی اگر زیر 60 سال داشته باشید.

#### آیا واکسن استرازنکا برای افرادی که قبلاً لخته خون داشته اند امن است؟

اگر در گذشته انواع دیگری از لخته شدن خون داشته باشید یا در معرض خطر لخته شدن خون هستید، هنوز هم می توانید واکسن استرازنکا را دریافت کنید. شواهدی وجود ندارد که نشان دهد داشتن لخته خون قبلی خطر ابتلا به TTS را به دنبال دریافت واکسن استرازنکا افزایش می دهد.

#### برای کسب اطلاعات بیشتر

اگر سوالی در مورد واکسن استرازنکا دارید، با پزشک خود صحبت کنید، به وب سایت [www.health.gov.au/covid19-languages-vaccines](http://www.health.gov.au/covid19-languages-vaccines) بروید، یا با خط تلفن ملی کرونا وپروس به شماره 1800 020 080 تماس بگیرید. برای خدمات ترجمه شفاهی و کتبی با شماره 131 450 تماس بگیرید.