



Informazioni su AstraZeneca

Vaccino AstraZeneca

Esiste un legame tra il vaccino AstraZeneca e una patologia molto rara che comporta la formazione di coaguli di sangue e bassi livelli di piastrine. La patologia è chiamata trombosi con trombocitopenia trombotica (TTS).

La vaccinazione contro il COVID-19 è raccomandata per tutti gli adulti. Il vaccino Pfizer è il vaccino contro il COVID-19 preferito per gli adulti di età inferiore ai 60 anni. Tuttavia, gli adulti di età inferiore ai 60 anni di età possono comunque scegliere il vaccino AstraZeneca. Parlatene con il vostro medico che vi aiuterà a prendere una decisione.

Il vaccino AstraZeneca sarà somministrato alle persone di età pari o superiore a 60 anni.

Cos'è la trombosi con trombocitopenia trombotica (conosciuta anche come TTS)?

Trombosi significa coagulo di sangue.

Trombocitopenia significa basso livello di piastrine nel sangue.

La TTS è un potenziale effetto collaterale molto raro del vaccino AstraZeneca. Se si verifica, può essere grave e può causare disabilità o la morte. La TTS causa coaguli di sangue, che si possono trovare in diverse parti del corpo. Può anche causare bassi livelli di piastrine, che possono comportare emorragie.

Quando si verifica la TTS?

I casi riportati di TTS si sono verificati tra i 4 e i 42 giorni successivi alla vaccinazione, solitamente con la prima dose del vaccino AstraZeneca.

Quanto è comune la TTS?

La TTS è rara. Si stima attualmente che l'incidenza sia stata di 1-2 persone su 100.000 a cui è stato somministrato il vaccino AstraZeneca contro il COVID-19. Ma per coloro al di sotto dei 60 anni, il tasso stimato è maggiore, circa 2-3 persone su 100.000. Queste stime saranno aggiornate man mano che le informazioni diverranno disponibili.

Ci sono dei gruppi più a rischio di insorgenza della TTS?

La TTS sembra essere più comune nei giovani, anche se sono stati riportati casi negli adulti più anziani. Non sappiamo se ci sono delle patologie mediche preesistenti che possano contribuire alla formazione di coaguli. I ricercatori stanno facendo indagini

Quali sono i sintomi della TTS?

La TTS può causare alcuni dei seguenti sintomi:

- un continuo mal di testa che:
 - compare almeno 2 giorni *dopo* la vaccinazione
 - non migliora con semplici antidolorifici
 - può peggiorare quando ci si sdraia
- nausea e vomito
- vista offuscata
- difficoltà a parlare
- sonnolenza
- attacchi
- difficoltà a respirare
- dolore al petto
- gambe gonfie
- continuo mal di stomaco
- piccole macchie di sangue sottocutanee lontano dal sito di iniezione.

Se voi o un'altra persona sviluppate uno qualsiasi di questi gravi effetti collaterali dopo la vaccinazione contro il COVID-19, dovete chiamare immediatamente il numero 000.

I vantaggi del vaccino AstraZeneca sono maggiori dei rischi?

Sì. I vantaggi della vaccinazione sono maggiori dei rischi, specialmente per le persone che presentano un rischio più alto di ammalarsi gravemente di COVID-19

Cosa succede se si ha meno di 60 anni e si ha un appuntamento per ricevere la prima dose di AstraZeneca?

Se avete un appuntamento per ricevere la prima dose del vaccino AstraZeneca e avete meno di 60 anni, rivolgetevi al vostro medico. Vi aiuterà a decidere se sottoporvi a vaccinazione.

Cosa succede se è stata somministrata la prima dose di AstraZeneca e si deve ricevere la seconda dose?

Quasi tutti i casi riportati di TTS si sono verificati dopo la prima dose del vaccino AstraZeneca contro il COVID-19. Se non avete avuto effetti collaterali gravi dopo la prima dose del vaccino AstraZeneca, potete stare sicuri nel ricevere la seconda dose, anche se avete meno di 60 anni

Il vaccino AstraZeneca è sicuro per le persone che hanno avuto coaguli di sangue in passato?

Se avete avuto altri tipi di coaguli di sangue in passato, o siete a rischio di coaguli di sangue, potete comunque ricevere il vaccino AstraZeneca. Non ci sono prove che aver avuto coaguli di sangue in precedenza aumenti il rischio di TTS in seguito al vaccino AstraZeneca.

Per maggiori informazioni

Se avete domande sul vaccino AstraZeneca, rivolgetevi al vostro medico, visitate www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages, o chiamate la Linea informativa nazionale sul

coronavirus (National Coronavirus Helpline) al numero 1800 020 080. Per i servizi di traduzione e interpretariato chiamate il 131 450.