



Informações sobre a AstraZeneca

Vacina AstraZeneca

Existe uma ligação entre a vacina AstraZeneca e um problema raro, que envolve coágulos sanguíneos e níveis baixos de plaquetas sanguíneas. Este problema é chamado de Síndrome de Trombose com Trombocitopenia (TTS).

A vacinação contra a COVID-19 é recomendada para todos os adultos. A vacina Pfizer é a vacina preferida contra a COVID-19 para adultos com menos de 60 anos de idade. No entanto, adultos com menos de 60 anos de idade ainda podem escolher receber a vacina AstraZeneca. Fale com o seu médico, se precisar de ajuda para decidir.

A vacina AstraZeneca será aplicada em pessoas a partir de 60 anos de idade.

O que é a Síndrome de Trombose com Trombocitopenia (conhecida como TTS)?

Trombose significa coágulo sanguíneo.

Trombocitopenia significa níveis baixos de plaquetas sanguíneas.

A TTS é um possível efeito colateral raro da vacina AstraZeneca. Se ocorrer, de fato, pode ser grave e causar deficiências ou morte. A TTS causa coágulos sanguíneos, que podem ocorrer em diversas partes do organismo. Também pode causar níveis baixos de plaquetas sanguíneas, o que pode causar uma hemorragia.

Quando ocorre a TTS?

Os casos notificados de TTS ocorreram entre o 4º e o 42º dia após a vacinação, geralmente com a primeira dose da vacina AstraZeneca.

A TTS é comum?

A TTS é rara. No momento, estima-se que ela afete uma ou duas pessoas em cada 100.000 pessoas que recebem a vacina AstraZeneca contra COVID-19. Mas, para aqueles com menos de 60 anos de idade, estima-se que a taxa seja mais alta, aproximadamente duas ou três pessoas em cada 100.000 pessoas. Estas estimativas serão atualizadas à medida que mais informações se tornarem disponíveis.

Existe algum grupo com maior risco de desenvolver a TTS?

A TTS parece ser mais comum em adultos mais jovens, embora tenha sido relatada em alguns adultos mais velhos. Não sabemos se existem problemas médicos preexistentes que possam contribuir para a ocorrência de coágulos sanguíneos. Os pesquisadores estão investigando isto.

Quais são os sintomas da TTS?

A TTS pode causar alguns dos seguintes sintomas:

- dor de cabeça intensa e persistente que:
 - aparece pelo menos 2 dias *após* a vacinação
 - não melhora com analgésicos simples
 - pode piorar ao deitar-se
- náusea e vômitos
- visão turva / enevoada
- dificuldade para falar
- sonolência
- convulsões
- dificuldade para respirar
- dor no peito
- inchaço nas pernas
- dor de estômago persistente
- pequenas manchas de sangue sob a pele e longe do local da injeção.

Se você ou outra pessoa tiverem algum destes efeitos colaterais graves após receber a vacinação contra COVID-19, devem ligar imediatamente para 000.

Os benefícios da vacina AstraZeneca são maiores do que os riscos?

Sim. Os benefícios da vacinação são maiores do que os riscos, especialmente para pessoas mais velhas, que têm um risco maior de desenvolver doenças graves com a COVID-19.

E se tiver menos de 60 anos e já tiver agendado para receber a primeira dose da AstraZeneca?

Se já tiver agendado a primeira dose da vacina AstraZeneca e tiver menos de 60 anos de idade, fale com o seu médico. Ele irá ajudá-lo a decidir se deve receber a vacina.

E se já recebeu a primeira dose da AstraZeneca e chegou o momento de receber a segunda dose?

Quase todos os casos notificados de TTS ocorreram após a primeira dose da vacina AstraZeneca contra COVID-19. Se não teve nenhum efeito colateral grave após a primeira dose da vacina AstraZeneca, pode ficar tranquilo para receber a segunda dose, mesmo que tenha menos de 60 anos de idade.

A vacina AstraZeneca é segura para pessoas que já tiveram coágulos sanguíneos no passado?

Se já teve outros tipos de coágulos sanguíneos no passado, ou se tem risco de desenvolver coágulos sanguíneos, ainda pode receber a vacina AstraZeneca. Não há evidência de que coágulos sanguíneos anteriores aumentem o risco de TTS após a vacina AstraZeneca.

Para mais informações

Se tiver dúvidas sobre a vacina AstraZeneca, fale com o seu médico, visite www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages ou ligue para o Disque-Ajuda Nacional sobre o Coronavírus, no número 1800 020 080. Para o serviço de tradutores e intérpretes, ligue para 131 450.