



ແມ່ຍິງຖືພາສາມາດ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ Pfizer COVID-19

ຢາວັກຊີນ **Pfizer COVID-19** ໄດ້ຖືກແນະນຳໃຫ້ສັກໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາແລະສັກໄດ້ທຸກໆລະຍະຂອງການຖືພາ. ມີຄວາມສ່ຽງສູງວ່າແມ່ຍິງຖືພາແລະລູກໃນທ້ອງຈະເຈັບປ່ວຍຢ່າງຮ້າຍແຮງໄດ້ຈາກພະຍາດ **COVID-19**.

ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງແລະລູກໃນທ້ອງ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ Pfizer ສອງໂດສ, ໂດຍໃຫ້ມີລະຍະຫ່າງກັນສາມອາທິດ.

ແມ່ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ Pfizer ໄດ້ທຸກເວລາແລະສາມາດສືບຕໍ່ໃຫ້ລູກກິນນົມໄດ້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ.

ຖ້າທ່ານກຳລັງຖືພາ, ຈົ່ງເຮັດນັດພົບເພື່ອໄປລົມກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຈົ່ງເຂົ້າໄປທີ່ health.gov.au/covid19-vaccines-languages, ຫຼື ໂທເລກ **1800 020 080**.

ສຳລັບບໍລິການນາຍພາສາ, ໃຫ້ໂທເລກ **131450**.



COVID-19
VACCINATION