



Australian Government



準備接種 COVID-19 疫苗

最新更新日期：2021 年 7 月 30 日

確保您的資料正確無誤

在等待應約期間，您可以做一些準備功夫。

確保您在 [Medicare 的資料為最新資料](#)。若您有 Medicare 資格（註：若您沒有 Medicare 資格，您仍然可以接種 COVID-19 疫苗），您可以使用以下任何方法更新資料：

- 通過 [myGov](#) 的 [Medicare online 帳戶](#)
- [Express Plus Medicare 應用程式](#)。
- 致電 [Medicare 計劃](#)。

若您尚未設置帳戶，您可以：

- [登記 Medicare](#)，若您尚未登記。
- 若您已登記 Medicare，但未將 Medicare 連至 myGov，則要 [設定](#) 您的 Medicare online 帳戶。
- 若您不符合 Medicare 的資格，[請取得 Individual Health Identifier \(IHI\) \(個人健康 ID\)](#)。

接種疫苗後，您可以取得免疫接種記錄聲明以證明您的疫苗接種狀況。您可以在 [Services Australia](#) 網站上找到 [如何取得免疫接種記錄聲明](#)。

為您的約會做準備

澳洲和全球的 COVID-19 疫苗供應有限。因此在患上嚴重 COVID-19 疾病和 / 或接觸病毒方面，風險最高的人將首先接種疫苗。其他人會在隨後接種疫苗。請瀏覽 www.health.gov.au/covid19-vaccines 找出何人將優先接種疫苗。您可以瀏覽 <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/> 查看您是否可以預約接種 COVID-19 疫苗。

若您有以下情況，則不應出席 COVID-19 疫苗接種約會：

- 因發燒、咳嗽、流鼻涕或其他症狀而感到不適，此等症狀可能來自 COVID-19
- 正在等待 COVID-19 檢測結果
- 您的 COVID-19 檢測結果呈陽性，並正在隔離
- 正在檢疫隔離
- 與 COVID-19 患者有密切接觸。

若您屬於上述任何類別，請向您的免疫接種提供者查問。您可能需要重新安排疫苗接種時間。COVID-19 疫苗不能有效治療 COVID-19。

若您在預約接種 COVID-19 疫苗之前的 7 天內曾接種過另一種疫苗，請告知您的免疫接種提供者。您的免疫接種提供者可能會要求您重新安排約會。

若您沒有發燒或任何呼吸道症狀，則無需在接種疫苗前接受 COVID-19 檢測。

為接種兩劑疫苗提前計劃

重要的是您需要接種兩劑 COVID-19 疫苗。若您接種輝瑞(Pfizer) Comirnaty COVID-19 疫苗，兩劑至少要相隔 3 星期。若您接種阿斯利康(AstraZeneca) COVID-19 疫苗，則應該相隔 12 星期，在某些情況下，兩劑之間的接種時間可以從 12 週縮短至不小於 4 週。直到您接種第二劑疫苗約一至兩週後，才能得到預防 COVID-19 的最佳保護。

接種疫苗時的期望

您應該攜帶以下物品出席您的 COVID-19 疫苗接種約會：

- 附相片的身份證明（如有）
- Medicare 卡（如有）
- 員工 ID，若您因職業而接種 COVID-19 疫苗。
- 有關您的任何醫療狀況、過敏、出血性疾病或免疫力低下（即免疫系統減弱）的資料
- 有關您正在服用的任何藥物的資料
- 有關任何之前接種的 COVID-19 疫苗資料（疫苗品牌和疫苗接種日期）
- 有關您過去對任何疫苗的反應的資料
- 您現時的家庭醫生姓名和您正在看的任何專科醫生的姓名
- 口罩（若您所在的州/領地要求）。

應約時，您將可以與免疫接種提供者討論有關 COVID-19 疫苗接種的任何問題。

若您為 60 歲以下人士、您有任何健康狀況或正在服用任何藥物，請告知您的免疫接種提供者。尤其要確保告訴他們您：

- 曾對之前接種過的 COVID-19 疫苗或疫苗的成份有過敏反應
- 曾對其他疫苗或其他藥物有過敏性休克反應（嚴重過敏反應）
- 在專家審查後歸因於先前一劑 COVID-19 疫苗的其他嚴重不良事件
- 確診患有肥大細胞增多症 (mastocytosis)，並有復發過敏性休克而需要治療
- 曾被診斷患有毛細血管滲漏綜合症
- 在接種過 COVID-19 疫苗後曾出現過嚴重靜脈和 / 或動脈血栓，同時伴隨血小板減少症 (thrombocytopenia)，包括診斷為血栓性血小板減少綜合症(TTS)
- 曾有以下病歷：肝素引起之血小板低下(heparin induced thrombocytopenia, HIT)、腦靜脈竇栓塞 (central venous sinus thrombosis, CVST)、腹靜脈（內臟靜脈）血栓塞或抗磷脂綜合症 (antiphospholipid syndrome) 血栓塞
- 曾有心肌炎 (myocarditis) 和 / 或心包炎 (pericarditis)
- 現正或最近有急性風濕熱或心內膜炎(endocarditis)
- 有先天性心臟病
- 有擴張型心肌病（30 歲以下人士）
- 有嚴重心衰竭
- 曾接受心臟移植
- 有出血性疾病或正在接受抗凝血治療（血液稀釋劑）
- 正在懷孕
- 免疫力低下（即免疫系統減弱或服用免疫抑制藥）
- 過去曾患上 COVID-19 或仍然持續有 COVID-19 病症
- 已接種另一種 COVID-19 疫苗（以及品牌名稱）
- 最近 7 天內曾接種任何疫苗

在某些情況下，最好在預約接種疫苗之前先與您的醫療服務提供者討論疫苗接種情況。您也可以查閱有關您接種的某一種疫苗的資料：

- [輝瑞 \(Comirnaty\) COVID-19 疫苗資料](#)，或
- [阿斯利康 \(AstraZeneca\) COVID-19 疫苗資料](#)

您將如何接種疫苗

疫苗會以注射形式接種，最常見的是注射到上臂肌肉中。接種疫苗後，您必須留在疫苗接種診所內至少 15 分鐘。視乎您的病歷，可能會要求您留在診所內 30 分鐘。

您應約時所提供的資料會被如何使用？

有關如何收集、儲存和使用您的個人詳細資料的資料，請瀏覽：

<https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>