



Australian Government

COVID-19
VACCINATION

辉瑞 (Comirnaty) 新冠疫苗

接种后须知

最近更新日期: 2021 年 8 月 18

新冠疫苗简介

您今天接种了辉瑞 **Comirnaty 新冠疫苗 (Pfizer Australia Pty Ltd)**。

该款疫苗可防止接种者患染新冠疾病 (COVID-19)。辉瑞新冠疫苗不含任何活病毒, 接种者也不会因接种疫苗而患染新冠疾病。该疫苗包含“尖峰蛋白”, 即 SARS-CoV-2 病毒一个重要组成部分的遗传密码。接种该疫苗后, 人体会复制尖峰蛋白, 免疫系统随即将学会识别和对抗 SARS-CoV-2 病毒。人体会迅速分解该遗传密码。

疫苗接种后会发生什么

与任何疫苗一样, 接种新冠疫苗后可能会出现一些副作用。

辉瑞疫苗常见的副作用包括:

- 注射部位疼痛或肿胀
- 疲劳
- 头痛
- 肌肉疼痛
- 发热和畏寒
- 关节疼痛。

辉瑞疫苗不太常见的副作用包括:

- 注射部位发红
- 恶心
- 淋巴结肿胀
- 感觉不适
- 四肢疼痛
- 失眠
- 注射部位瘙痒。

这些副作用通常很轻微，一般会在一两天内消失。与接种其他普通疫苗接种相比，一些接种者可能会因接种 Comirnaty 疫苗而出现更明显的流感样症状。每 4 到 20 个接受者中就有一个可能需要一段时间暂时停止正常活动。这些症状可能在接种两剂疫苗中任一剂后出现，但在接种第二剂后更常见。

接种疫苗后，如果注射部位感到疼痛或出现发烧、头痛或身体疼痛的症状，可服用扑热息痛 (paracetamol) 或布洛芬 (ibuprofen)。这类药物有助于减轻上述部分症状（在接种疫苗之前，无需要服用扑热息痛或布洛芬）。如果注射部位出现肿胀，可使用冷敷的方法。

辉瑞疫苗的罕见副作用包括：

- 严重的过敏反应（过敏性休克）
- 心肌炎（心肌发炎）和心包炎（心脏外膜发炎）。大多数报告的病例病情较轻、不会持续发展，并能很快恢复，但对这些病例的长期随访目前仍在进行中。报告的相关病例主要发生在接种第二剂之后，且主要发病群体是年轻男性（年龄 < 30 岁）。

接种疫苗后，若出现以下情况，应及时就医：

- 认为身体产生了过敏反应。若出现严重症状，例如呼吸困难、喘息、心跳加快或晕倒，请拨打 000
- 出现胸口疼痛、有压力或感到不适、心率不齐、心悸或“乱跳”、昏厥、气短或呼吸疼痛
- 担心潜在的副作用或出现新的或意外的症状
- 预期的副作用在接种几天后并未消失。

对于非紧急症状，可以像平时一样求医问药（例如，去看家庭医生）。

疫苗安全监测与副作用通报

接种者可向疫苗接种机构或其他医疗保健专业人员通报疫苗的疑似副作用。他们将代表您向所在州或领地的卫生部门或直接向治疗用品管理局 (TGA) 提交正式报告。

欲自行通报，请访问 TGA 网站上[报告新冠疫苗疑似副作用的网页](#)，然后按照页面上的说明进行操作。

疫苗接种后的新冠检测

接种新冠疫苗后产生的一些副作用可能类似于感染新冠病毒的症状（例如发烧），但新冠疫苗不含任何活病毒，不会导致接种者感染新冠病毒。如果出现以下状况，可能无需接受新冠病毒检测或隔离：

- 如果在疫苗接种后的头两天内出现发烧、头痛或疲劳等一般症状，并且
- 确定自己没有任何呼吸道症状（例如流鼻涕、咳嗽、喉咙痛、嗅觉丧失或味觉丧失）。

但应查看所在州/领地当前的防疫指南，获取最新信息。如果所在地区爆发新冠疫情，此建议可能会改变。如果符合其他标准（例如，密切接触过已知新冠感染病例），则可能仍需接受新冠病毒检测。若有疑问，请及时就诊。

请不要忘记接种第二剂疫苗

接种者一定要接种两剂辉瑞疫苗，通常两剂疫苗的接种会间隔 3 至 6 周，但对于一些特殊情况，也可能建议延长间隔时间。接种第二剂疫苗可能延长抵御新冠病毒的保护作用。

接种疫苗时所提供个人信息的使用方式

有关如何收集、存储和使用个人信息的信息，请访问 <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>