



Australian Government



接種 Comirnaty (輝瑞) COVID-19 疫苗後

最新更新日期：2021 年 8 月 18 日

關於疫苗

您今天接種了 **Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd)** 疫苗。

此疫苗可以防止因感染 COVID-19 而患病。輝瑞 COVID-19 疫苗不含任何活病毒，也無法使您染上 COVID-19。它含有 SARS-CoV-2 病毒重要部份的遺傳密碼，稱為刺突蛋白 (spike protein)。接種疫苗後，您的身體會複製刺突蛋白，然後您的免疫系統會學會識別並抵抗 SARS-CoV-2 病毒。身體可以很快分解此遺傳密碼。

接種疫苗後可以預期的情況

與任何疫苗一樣，您在接種 COVID-19 疫苗後可能會出現一些副作用。

接種輝瑞疫苗後的常見副作用包括：

- 注射部位疼痛或腫脹
- 疲勞
- 頭痛
- 肌肉疼痛
- 發燒及發冷
- 關節疼痛。

接種輝瑞疫苗後不常見的副作用包括：

- 注射部位發紅
- 噁心
- 淋巴結腫大
- 不適
- 四肢疼痛
- 失眠
- 注射部位痕癢。

這些副作用通常輕微，並會在一兩天內消失。有些人接種疫苗後會有類似流感的症狀，但與其他普通疫苗相比，症狀會更為明顯，並且可能需要遠離正常活動一段時間。這些症狀可能在第一劑或第二劑後出現，但在第二劑後較常見。

接種後若注射部位出現疼痛或您有發燒、頭痛或身體疼痛，可以服用撲熱息痛(paracetamol)或布洛芬(ibuprofen)。這些有助減輕上述部份症狀（接種疫苗前無需服用撲熱息痛或布洛芬）。若注射部位腫脹，可以使用冷敷。

接種輝瑞疫苗後已接獲報告的罕見副作用有：

- 嚴重過敏反應（過敏性休克）
- 心肌炎 (myocarditis, 心臟肌肉發炎) 和心包炎 (pericarditis, 心包膜發炎)。大多數報告的病例都是輕微，並且很快恢復，然而這些病例的長期跟進仍在進行。報告的病例主要發生在第二劑後，主要是年輕男性（30歲以下）。

若在接種疫苗後出現以下情況，則應就醫：

- 您認為自己有過敏反應。若您有嚴重症狀，例如呼吸困難、氣喘、心跳加快或昏倒，致電 000
- 您的胸口感到疼痛、受壓或不適、心律不齊、心跳漏拍或「顫動」、昏厥、氣促或呼吸疼痛
- 您擔心有可能出現副作用，或有新的或意想不到的症狀
- 這種疫苗預期會有的副作用出現在您身上，幾天後仍未消失。

對於非緊急症狀，您可以諮詢您的日常醫療服務提供者（例如您的家庭醫生）。

疫苗安全監測和報告副作用

您可以將懷疑出現的副作用向您的疫苗接種供應商或其他醫療服務專業人員報告。然後，他們會代表您向您的州或領地衛生部門或直接向治療產品管理局（Therapeutic Goods Administration, TGA）提交正式報告。

若您希望自己提出報告，請瀏覽 TGA 網站內[報告與 COVID-19 疫苗相關可疑副作用的頁面](#)，並按照頁面指示操作。

接種疫苗後的 COVID-19 檢測

接種 COVID-19 疫苗的某些副作用可能類似 COVID-19 症狀（例如發燒），然而輝瑞不含任何活病毒並且不能引致 COVID-19。在以下情況下，您可能無須接受 COVID-19 檢測或隔離：

- 若在接種疫苗後的首兩天出現發燒、頭痛或疲倦等一般症狀，並且
- 您確定沒有任何呼吸道症狀（例如流鼻涕、咳嗽、喉嚨痛、喪失嗅覺或喪失味覺）。

然而，您應該查看您所在州 / 領地的現有指引，以取得最新資料。若您所在地區爆發 COVID-19，此建議可能會有變。若您符合其他條件，您可能仍需要接受 COVID-19 檢測，例如您與已知的 COVID-19 個案有密切接觸。若有疑問，請尋求醫療評估。

記住您的第二次約會

重要的是，您必須接種兩次輝瑞疫苗，兩劑之間一般相隔 3-6 星期，然而在特殊情況下，可能會建議相隔更長時間。第二劑疫苗非常可能可以延長保護防止感染 COVID-19 的時間。

您應約時所提供的資料會被如何使用

有關如何收集、儲存和使用您的個人詳細資料的資料，請瀏覽 <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>