



Australian Government



# Nakon cijepljenja protiv COVID-19 – Comirnaty (Pfizer) cjepivom

Zadnji put ažurirano 18. kolovoza 2021.

## O cjepivu

Danas ste primili cjepivo **Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd)**.

To cjepivo može spriječiti oboljevanje od COVID-19. Pfizer cjepivo protiv COVID-19 ne sadrži živi virus i od njega ne možete dobiti COVID-19. Cjepivo sadrži genetički kod za važan dio SARS-CoV-2 virusa pod nazivom šiljasti protein. Nakon cijepljenja organizam proizvodi kopije šiljastog proteina. Uslijed toga imunološki sustav nauči prepoznati SARS-CoV-2 virus i boriti se protiv njega. Organizam brzo razlaže genetički kod.

## Što možete očekivati nakon cijepljenja

Kao i kod svakog cjepiva, i nakon cijepljenja protiv COVID-19 moguće je da će nastati neke nuspojave.

**Uobičajene** nuspojave cjepiva **Pfizer** uključuju:

- bol ili otok na mjestu uboda injekcije
- umor
- glavobolju
- bolove u mišićima
- vrućicu i zimicu
- bolove u zglobovima.

**Rjeđe** nuspojave cjepiva **Pfizer** uključuju:

- crvenilo na mjestu uboda injekcije
- mučninu
- uvećane limfne čvorove
- uopćeno se loše osjećate
- bolove u udovima
- nesanicu
- svrabež na mjestu uboda injekcije.

Ove nuspojave su obično blage i nestaju u roku od jednog ili dva dana. Neke osobe će od cjeviva dobiti simptome slične gripi koji su značajniji u usporedbi s drugim uobičajenim cijepljenjima i možda neće moći obavljati svoje normalne aktivnosti. Ti simptomi se mogu javiti i nakon prve i nakon druge doze cjeviva, ali se češće javljaju nakon druge doze.

Ako nakon cijepjenja dobijete bolove na mjestu uboda injekcije ili vrućicu, glavobolju ili bolove u cijelom tijelu, možete uzeti paracetamol ili ibuprofen. Ti lijekovi će ublažiti neke od gornjih simptoma (prije cijepjenja ne trebate uzeti paracetamol ili ibuprofen). Ako se na mjestu uboda injekcije pojavi otok, možete staviti hladne obloge.

**Rijetke** nuspojave koje su prijavljene nakon primanja cjeviva **Pfizer** su:

- ozbiljna alergijska reakcija (anafilaksa)
- miokarditis (upala srčanog mišića) i perikarditis (upala srčane ovojnice). U većini prijavljenih slučajeva su bili blagi i oporvak je brzo uslijedio, mada je dugoročno praćenje tih slučajeva još uvijek u tijeku. Slučajevi su prijavljivani poglavito nakon druge doze i većinom kod mlađih muškaraca (u dobi ispod 30 godina).

Trebate zatražiti medicinsku pomoć nakon cijepjenja, ako:

- mislite da imate alergijsku reakciju. Nazovite 000 ako dobijete ozbiljne simptome, na primjer otežano ili hriptavo disanje, brze otkucaje srca ili kolapsirate
- imate bolove, pritisak ili neugodan osjećaj u prsima, neredovite otkucaje, preskakanje ili treperenje srca, padanje u nesvijest, otežano disanje ili bolove kad dišete
- vas zabrinjava potencijalna nuspojava ili su se pojavili novi ili neočekivani simptomi
- imate očekivanu nuspojavu cjeviva koja nije prošla nakon nekoliko dana.

Za simptome koji nisu hitne prirode, možete otići kod vašeg redovitog zdravstvenog djelatnika (npr. liječnika opće prakse).

## Praćenje sigurnosti cjeviva i prijavljivanje nuspojave

Nuspojave na koje sumnjate da su nastale od cjeviva možete prijaviti davatelju cjeviva ili drugom zdravstvenom djelatniku. Zdravstveni djelatnik će zdravstvenim vlastima države ili teritorija ili izravno Upravi za terapijske proizvode (Therapeutic Goods Administration - TGA) podnijeti zvanično izvješće u vaše ime.

Ako sami želite prijaviti nuspojave, to možete uraditi na internetskim stranicama TGA - [prijava nuspojave za koje se sumnja da su nastale od cjeviva protiv COVID-19 - reporting suspected side effects associated with a COVID-19 vaccine webpage](#) - i slijedite naputke na toj stranici.

## Testiranje na COVID-19 nakon cijepjenja

Neke nuspojave cjeviva protiv COVID-19 mogu biti slične simptomima oboljenja od COVID-19 (npr. vrućica). Međutim, Pfizer cjevivo ne sadrži živi virus i ne može prouzročiti COVID-19. Nećete se morati testirati na COVID-19, niti biti u izolaciji:

- ako u prva dva dana nakon cijepjenja dobijete samo uobičajene simptome, na primjer vrućicu, glavobolju ili umor i
- ako ste sigurni da nemate respiracijske simptome (npr. curenje nosa, kašalj, grlobolju, gubitak osjeta mirisa ili okusa).

Međutim, za ažurirane informacije trebate provjeriti koje smjernice su trenutno na snazi u vašoj državi / teritoriju. Te smjernice se mogu promijeniti ako u vašem kraju izbije epidemija COVID-19. Morat ćete se testirati na COVID-19 ako ispunjavate druge kriterije, npr. ako ste bili u bliskom kontaktu s potvrđenim slučajem COVID-19. Ako niste sigurni, trebate otići na liječnički pregled.

## Ne zaboravite otići i na drugi termin

Važno je primiti dvije doze Pfizer cjeviva protiv COVID-19. Doze se primaju u razmaku od tri do šest tjedana, mada u nekim posebnim okolnostima taj razmak može biti i duži. Vjerojatno je da druga doza produljuje trajanje zaštite od COVID-19.

## Kako se koriste podaci koje date prigodom cijepljenja

Za informacije o prikupljanju, pohranjivanju i uporabi vaših osobnih podataka, posjetite <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>