



Australian Government



Comirnaty (Pfizer) - koronavirusrokotuksen jälkeen

Viimeksi päivitetty: 18.8.2021

Tietoa rokotteesta

Olet tänään saanut **Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd) -rokotteen**.

Tämä rokote voi estää sairastumisen koronavirustautiin. Pfizer-koronavirusrokote ei sisällä elävää virusta, eikä se voi aiheuttaa koronavirustautia. Se sisältää SARS-CoV-2-viruksen tärkeän osan, piikkiproteiinin, geneettisen koodin. Rokotteen saatuaan keho tekee kopioita piikkiproteiinista. Näin immuunijärjestelmä oppii tunnistamaan koronavirustautia aiheuttavan SARS-CoV-2-viruksen ja torjumaan sitä. Keho hajottaa geneettisen koodin nopeasti.

Mitä rokotuksen jälkeen on odotettavissa

Kuten kaikkien rokotusten, koronavirusrokotuksen jälkeenkin saattaa ilmetä haittavaikutuksia.

Yleisiä haittavaikutuksia **Pfizer-rokotteen** jälkeen ovat:

- pistoskohdan kipu tai turvotus
- väsymys
- päänsärky
- lihaskivut
- kuume ja vilunväristykset
- nivelkivut.

Harvinaisempia haittavaikutuksia **Pfizer-rokotteen** jälkeen ovat:

- pistoskohdan punoitus
- pahoinvointi
- suurentuneet imusolmukkeet
- huonovointisuus
- pistosraajan kipu
- unettomuus
- pistoskohdan kutina.

Nämä haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja menevät ohi parissa päivässä. Jotkut saavat tästä rokotteesta merkittävämpiä flunssaa muistuttavia oireita kuin muista tavallisista rokotuksista ja saattavat tarvita enemmän lepoa. Oireet saattavat ilmetä kumman rokoteannoksen jälkeen tahansa, mutta yleisemmin toisen annoksen jälkeen.

Rokotuksen jälkeistä pistoskohdan kipua tai kuumetta, päänsärkyä tai muita särkyjä voi hoitaa parasetamolilla tai ibuprofeenilla. Ne auttavat vähentämään edellä mainittuja oireita (parasetamolia tai ibuprofeenia ei tarvitse ottaa ennen rokotusta). Pistoskohdan turvotusta voi hoitaa kylmäpakkauksella.

Harvinaisia haittavaikutuksia, joita on raportoitu **Pfizer-rokotteen** jälkeen, ovat:

- vakava allerginen reaktio (anafylaksia)
- sydänlihastulehdus (myokardiitti) ja sydänpussitulehdus (perikardiitti). Useimmat ilmoitetut tapaukset ovat olleet lieviä ja niistä on toivuttu nopeasti, vaikka näiden tapausten pitempiaikainen seuranta jatkuu edelleen. Tapauksia on ilmoitettu useimmiten toisen annoksen jälkeen ja enimmäkseen nuoremmilla miehillä (alle 30-vuotiailla).

Hakeudu lääkärin hoitoon rokotuksen jälkeen, jos:

- arvelet saaneesi allergisen reaktion. Soita 000, jos sinulla on vakavia oireita, kuten hengitysvaikeuksia, hengityksen vinkumista, sydämentykytystä tai lyyhistyt
- tunnet kipua, painetta tai epämukavaa oloa rinnassa, sydän lyö epäsäännöllisesti, lyöntejä jää väliin tai sydän värisee, sinua pyörryttää, tunnet hengenahdistusta tai kipua hengittäessäsi
- olet huolissasi mahdollisesta haittavaikutuksesta tai sinulla on uusia tai odottamattomia oireita
- rokotteen odotuksenmukainen haittavaikutus ei ole hävinnyt muutamassa päivässä.

Kiireettömät oireet voi näyttää terveydenhuollon tarjoajalle, jonka luona tavallisesti käyt (esim. oma lääkärisi).

Rokoteturvallisuuden seuranta ja haittavaikutusten raportointi

Voit ilmoittaa epäillyt haittavaikutukset rokotuksen antajalle tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle. He laativat sitten puolestasi virallisen ilmoituksen asuinosaavaltiosi tai -territoriosi terveysministeriölle tai suoraan Therapeutic Goods Administration -virastolle (TGA).

Jos haluat mieluummin ilmoittaa siitä itse, käy TGA:n sivustolla olevalla [ilmoitussivulla koronavirusrokotteeseen liittyvistä epäillyistä haittavaikutuksista](#) ja noudata sivulla olevia ohjeita.

Koronavirustestaus rokotuksen jälkeen

Jotkut koronavirusrokotuksen haittavaikutukset saattavat muistuttaa koronavirustaudin oireita (esim. kuume). Pfizer-rokote ei kuitenkaan sisällä elävää virusta, eikä voi aiheuttaa koronavirustautia. Et ehkä tarvitse koronavirustestausta tai eristäytymistä, jos:

- saat yleisoireita, kuten kuumetta, päänsärkyä tai väsymystä kahden ensimmäisen päivän aikana rokotuksen jälkeen, ja
- olet varma, ettei sinulla ole hengitystieoireita (esim. nuha, yskä, kurkkukipu, hajuainin tai makuainin menetys).

Tarkista kuitenkin asuinosaavaltiosi tai -territoriosi ajantasaiset ohjeet. Ohjeistus voi muuttua, jos asuinalueellasi ilmenee koronavirustautia. Saatat silti tarvita koronavirustestin, jos muut kriteerit täyttyvät, kuten jos olet tunnistetun koronavirustautitapauksen lähikontakti. Jos olet epävarma, hakeudu lääkäriin.

Muista toinen rokotuskerta

On tärkeää saada kaksi annosta Pfizer-koronavirusrokotetta. Rokotusten välillä on yleensä 3–6 viikkoa, mutta erityistilanteissa voidaan suositella pidempääkin väliä. Toinen annos todennäköisesti pidentää rokotteen antamaa suojaa koronavirustaudilta.

Miten rokotuksessa antamiasi tietoja käytetään

Tietoa henkilötietojesi keräämisestä, tallentamisesta ja käyttämisestä on osoitteessa <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>