



Australian Government



# Successivamente alla vaccinazione Comirnaty (Pfizer) contro il COVID-19

Ultimo aggiornamento: 18 agosto 2021

## Informazioni sul vaccino

Oggi avete ricevuto il **vaccino Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd)**.

Questo vaccino può impedire che le persone si ammalino a causa del COVID-19. Il vaccino Pfizer contro il COVID-19 non contiene alcun virus vivo e non può causare il COVID-19. Contiene il codice genetico di una parte importante del virus SARS-CoV-2 chiamata proteina spike. Dopo aver ricevuto il vaccino il vostro corpo realizza delle copie della proteina spike. Il vostro sistema immunitario quindi apprende come riconoscere e combattere il virus SARS-CoV-2. Il corpo smaltisce velocemente il codice genetico.

## Cosa attendersi dopo la vaccinazione

Come per qualsiasi vaccino, potreste avere alcuni effetti collaterali dopo aver ricevuto un vaccino contro il COVID-19.

Gli effetti collaterali **comuni** di **Pfizer** includono:

- dolore o gonfiore nel punto di iniezione
- stanchezza
- mal di testa
- dolore muscolare
- febbre e brividi
- dolore articolare.

Gli effetti collaterali **meno comuni** di **Pfizer** includono:

- rossore nel punto di iniezione
- nausea
- gonfiore dei linfonodi
- malessere
- dolore negli arti
- insonnia
- prurito nel punto di iniezione.

Questi effetti collaterali in genere sono lievi e scompaiono entro uno o due giorni. Alcuni destinatari avranno sintomi influenzali più significativi dovuti a questo vaccino rispetto ad altre comuni vaccinazioni e potrebbero richiedere di avere del tempo lontano dalle normali attività. Questi sintomi possono verificarsi dopo qualsiasi dose, ma sono più comuni dopo la seconda dose.

Se avete dolore nel punto di iniezione o febbre, mal di testa e dolori corporei successivamente alla vaccinazione potete prendere del paracetamolo o dell'ibuprofene. Questi aiutano ad alleviare alcuni dei sintomi di cui sopra (non è necessario prendere paracetamolo o ibuprofene prima della vaccinazione). Se il punto di iniezione è gonfio potete utilizzare una compressa fredda.

Gli effetti collaterali **rari** riscontrati nel caso di **Pfizer** sono:

- grave reazione allergica (anafilassi)
- miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco) e pericardite (infiammazione della membrana esterna del cuore). La maggior parte dei casi denunciati è stata lieve e con un rapido recupero, sebbene il follow-up di più lungo termine di questi casi sia ancora in corso. I casi sono stati riportati prevalentemente dopo la seconda dose e prevalentemente negli uomini più giovani (età < 30 anni).

Successivamente alla vaccinazione dovrete rivolgervi a un medico se:

- ritenete di avere una reazione allergica. Chiamate il 000 se avete sintomi gravi come la difficoltà a respirare, il rantolo, il battito cardiaco rapido o il collasso
- avete dolore, pressione o fastidio al petto, battito cardiaco irregolare, battiti mancati o anomali, svenimenti, fiato corto o dolore quando respirate
- siete preoccupati di un potenziale effetto collaterale o avete sintomi nuovi o inattesi
- avete un effetto collaterale prevedibile del vaccino che non scompare dopo alcuni giorni.

Per i sintomi non urgenti potete rivolgervi al vostro normale professionista sanitario (ad esempio il vostro medico di base).

## Monitoraggio della sicurezza del vaccino e denuncia degli effetti collaterali

Potete denunciare gli effetti collaterali sospetti al vostro fornitore della vaccinazione o ad un altro professionista sanitario. Egli quindi sposterà una denuncia formale a vostro nome presso il ministero della sanità del vostro stato o territorio o direttamente alla Therapeutic Goods Administration (TGA).

Se preferite presentare denuncia voi stessi, visitate la [pagina web sulla denuncia di effetti collaterali sospetti associati al vaccino contro il COVID-19](#) sul sito web della TGA e seguite le istruzioni sulla pagina.

## Test per il COVID-19 successivamente alla vaccinazione

Alcuni effetti collaterali dovuti alla vaccinazione contro il COVID-19 potrebbero essere simili ai sintomi di COVID-19 (ad es. febbre). Tuttavia, Pfizer non contiene alcun virus vivo e non può causare il COVID-19. Potreste non dovervi sottoporre a test per il COVID-19 né isolarvi:

- se sviluppate sintomi generici come la febbre, il mal di testa o la stanchezza nei primi due giorni successivi alla vaccinazione e
- se siete sicuri di non avere alcun sintomo respiratorio (ad es. naso che cola, tosse, mal di gola, perdita dell'olfatto o perdita del gusto).

Tuttavia, dovete verificare le linee guida attuali nel vostro stato/territorio per avere le informazioni più aggiornate. Questa raccomandazione può cambiare in caso di focolai di COVID-19 nella vostra area locale. Potreste comunque dovervi sottoporre a test per il COVID-19 se si verificano gli altri criteri, ad esempio se siete un contatto ravvicinato di un caso

appurato di COVID-19. In caso di dubbi, rivolgetevi a un medico.

### **Ricordate il vostro secondo appuntamento**

È importante che riceviate due dosi del vaccino Pfizer contro il COVID-19. Queste dosi vengono in genere somministrate a 3-6 settimane di distanza, ma potrebbero essere raccomandati tempi più lunghi in circostanze speciali. È probabile che la seconda dose prolunghi la durata della protezione contro il COVID-19.

### **Come vengono utilizzate le informazioni che fornite durante il vostro appuntamento**

Per informazioni su come vengono raccolti, conservati e utilizzati i vostri dati personali, visitate <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>