



Australian Government

## COVID-19 VACCINATION

# Após sua vacinação contra COVID-19 com a Comirnaty (Pfizer)

Última atualização: 18 de agosto de 2021

### Sobre a vacina

Você tomou hoje a vacina **Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd)**.

Esta vacina pode evitar que as pessoas adoeçam com a COVID-19. A vacina Pfizer contra COVID-19 não contém nenhum vírus vivo e não tem como lhe transmitir a COVID-19. Ela contém o código genético de uma parte importante do vírus SARS-CoV-2 chamada proteína S. Após receber a vacina, seu organismo produz cópias da proteína S. Seu sistema imunológico aprenderá, então, a reconhecer e a combater o vírus SARS-CoV-2. O corpo humano destruirá rapidamente este código genético.

### O que esperar após a vacinação

Assim como qualquer outra vacina, você pode ter alguns efeitos colaterais após receber a vacina contra COVID-19.

Efeitos colaterais **comuns** após a **Pfizer** incluem:

- dor ou inchaço no local da injeção
- cansaço
- dor de cabeça
- dor muscular
- febre e calafrios
- dor nas articulações.

Efeitos colaterais **menos comuns** após a **Pfizer** incluem:

- vermelhidão no local da injeção
- náusea
- gânglios linfáticos aumentados
- indisposição
- dor no membro do corpo
- insônia
- coceira no local da injeção.

Estes efeitos colaterais geralmente são leves e passam dentro de um ou dois dias. Após a vacinação, algumas pessoas terão sintomas parecidos com os da gripe mais acentuados, se comparados com outras vacinas comuns, e talvez não possam realizar suas atividades normais por alguns dias. Tais sintomas podem ocorrer após a primeira ou a segunda dose, mas são mais comuns após a segunda dose.

Se tiver dor no local da injeção, febre, dor de cabeça ou dores no corpo após a vacinação, pode tomar paracetamol ou ibuprofeno. Eles ajudam a diminuir alguns dos sintomas acima (você não precisa tomar paracetamol nem ibuprofeno antes da vacinação). Se houver inchaço no local da injeção, pode usar uma compressa fria.

Estes são os efeitos colaterais **raros** que foram relatados após a **Pfizer**:

- Reação alérgica grave (anafilaxia)
- miocardite (inflamação do músculo cardíaco) e pericardite (inflamação da membrana externa do coração) . A maioria dos casos relatados tem sido leve e de recuperação rápida, apesar de haver um acompanhamento de longo prazo destes casos. Os casos têm sido relatados principalmente após a segunda dose e principalmente em homens mais novos (com menos de 30 anos de idade).

Você deve procurar atendimento médico após a vacinação se:

- achar que está tendo uma reação alérgica. Ligue para 000 se tiver sintomas graves, como por exemplo: dificuldade para respirar, respiração ofegante, batimento cardíaco acelerado ou colapso
- tiver dor, pressão ou desconforto no peito, batimento cardíaco irregular, com falhas ou “palpitação”, desmaio, falta de ar, ou dor ao respirar
- estiver preocupado com um potencial efeito colateral, ou tiver sintomas novos ou inesperados
- tiver um efeito colateral esperado da vacina que não tenha passado depois de alguns dias.

Para sintomas não urgentes, você pode ir até seu provedor de cuidados de saúde regular (seu Clínico Geral - GP).

## Monitorando a segurança da vacina e relatando efeitos colaterais

Você pode relatar suspeitas de efeitos colaterais ao seu provedor de vacinação ou a outros profissionais da saúde. Eles farão, então, um relato formal em seu nome para o departamento de saúde de seu estado ou território, ou diretamente para a Administração de Produtos Terapêuticos (TGA).

Se preferir relatar isto você mesmo, por favor, visite a [página da web para relatar suspeitas de efeitos colaterais associados à vacina contra COVID-19](#) no site da TGA e siga as instruções contidas na página.

## Teste para COVID-19 após a vacinação

Alguns efeitos da vacinação contra COVID-19 podem ser parecidos com os sintomas da COVID-19 (febre, por exemplo). No entanto, a Pfizer não contém nenhum vírus vivo e não poder causar a COVID-19. Talvez não precise fazer o teste para COVID-19 nem se isolar se:

- apresentar sintomas gerais, como febre, dor de cabeça ou cansaço, nos primeiros dois dias após a vacinação, e
- tiver certeza de que não está com nenhum sintoma respiratório (nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, perda de olfato ou perda de paladar, por exemplo).

No entanto, deve verificar as orientações atuais em seu estado/território para saber as últimas informações. Estas orientações podem mudar no caso de um surto de COVID-19 em sua

região. Você talvez ainda precise fazer o teste para COVID-19 se atender a outros critérios, como, por exemplo, se for contato próximo de um caso conhecido de COVID-19. Se estiver em dúvida, procure uma avaliação médica.

### **Lembre-se de sua segunda consulta**

É importante que você receba duas doses da Pfizer contra COVID-19. Estas doses são geralmente aplicadas com um intervalo de 3 a 6 semanas, porém intervalos mais longos podem ser recomendados em circunstâncias especiais. A segunda dose deve prolongar a duração da proteção contra a COVID-19.

### **Como são usadas as informações que você fornece em sua consulta**

Para informações sobre como seus dados pessoais são coletados, armazenados e usados, visite <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>