



Australian Government

**COVID-19**  
✓ **VACCINATION**

# După vaccinarea COVID-19 Comirnaty (Pfizer)

Ultima actualizare: 18 august 2021

## Despre vaccin

Astăzi ați făcut **vaccinul Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd)**.

Acest vaccin poate preveni îmbolnăvirea persoanelor de COVID-19. Vaccinul COVID-19 Pfizer nu conține niciun virus viu și nu vă poate da boala COVID-19. Acesta conține codul genetic pentru o parte importantă a virusului SARS-CoV-2 numit proteina spike. După ce ați făcut vaccinul, organismul dumneavoastră face copii ale proteinei spike. Sistemul dvs. imunitar va învăța apoi să recunoască și să lupte împotriva virusului SARS-CoV-2. Corpul descompune rapid codul genetic.

## La ce să ne așteptăm după vaccinare

Ca în cazul oricărui vaccin, s-ar putea să aveți unele reacții adverse după ce ați făcut un vaccin COVID-19.

Reacții adverse **comune** după **Pfizer** includ:

- durere sau umflătură la locul injectării
- oboseală
- durere de cap
- dureri musculare
- febră și frisoane
- dureri articulare.

Reacții adverse **puțin mai frecvente** după **Pfizer** includ:

- roșeață la locul injectării
- greață
- ganglioni limfatici măriți
- senzație de rău
- durere la nivelul membrelor
- insomnie
- mâncărime la locul injectării.

Aceste efecte adverse sunt de obicei ușoare și, de obicei, dispar în decurs de una sau două zile. S-ar putea ca unii dintre cei vaccinați să aibă simptome mai semnificative de gripă după această vaccinare în comparație cu alte vaccinări obișnuite, și să aibă nevoie să stea un timp

departe de activitățile obișnuite. Aceste simptome pot apărea după oricare dintre cele două doze, dar sunt mai comune după a doua doză.

Dacă aveți dureri la locul injectării sau febră, dureri de cap sau dureri corporale după vaccinare, puteți lua paracetamol sau ibuprofen. Acestea ajută la reducerea unora dintre simptomele de mai sus (nu trebuie să luați paracetamol sau ibuprofen înainte de vaccinare). Dacă locul injectării s-a umflat, puteți aplica o compresă rece.

Reacții adverse **rare** care au fost raportate după **Pfizer** sunt:

- Reacție alergică severă (anafilaxie)
- miocardită (inflamație a mușchiului inimii) și pericardită (inflamație a căptușelii exterioare a inimii). Cele mai multe cazuri raportate au fost ușoare și recuperate rapid, deși urmărirea pe termen mai lung a acestor cazuri este în curs. S-au raportat cazuri în special după a doua doză și în special la bărbații mai tineri (cu vârsta <30 de ani).

Ar trebui să solicitați asistență medicală după vaccinare dacă:

- credeți că aveți o reacție alergică. Sunați la 000 dacă prezentați simptome severe, cum ar fi dificultăți de respirație, respirație șuierătoare, bătăi rapide ale inimii sau colaps
- aveți dureri în piept, presiune sau disconfort, bătăi neregulate ale inimii, bătăi omise sau senzație de „fluturare”, leșin, respirație scurtă sau durere la respirație
- sunteți îngrijorat de un posibil efect secundar sau aveți simptome noi sau neașteptate
- aveți un efect secundar așteptat al vaccinului care nu a dispărut după câteva zile.

Pentru simptome care nu sunt urgente, puteți consulta furnizorul de servicii medicale curent (de obicei medicul de familie).

## Monitorizarea siguranței vaccinului și raportarea efectelor secundare

Puteți raporta reacțiile adverse suspectate furnizorului dvs. de vaccinare sau altui profesionist din domeniul sănătății. Ei vor face apoi un raport oficial în numele dvs. la departamentul de sănătate al statului sau teritoriului sau direct la Administrația Produselor Terapeutice (TGA).

Dacă preferați să raportați personal acest lucru, vă rugăm să vizitați secțiunea privind [raportarea efectelor secundare suspecte asociate cu vaccinul COVID-19 pe pagina web](#) a TGA și să urmați instrucțiunile de pe pagină.

## Testarea pentru COVID-19 după vaccinare

Unele reacții adverse ca urmare a vaccinării împotriva COVID-19 pot fi similare cu simptomele COVID-19 (de exemplu, febră). Cu toate acestea, Pfizer nu conține niciun virus viu și nu poate provoca COVID-19. Este posibil să nu fie nevoie să faceți un test COVID-19 sau să vă izolați:

- dacă dezvoltați simptome generale precum febră, durere de cap sau oboseală în primele două zile după vaccinare, și
- dacă sunteți sigur că nu aveți simptome respiratorii (de exemplu, nas care curge, tuse, dureri în gât, pierderea mirosului sau pierderea gustului).

Cu toate acestea, ar trebui să verificați instrucțiunile actuale din statul/teritoriul dvs. pentru cele mai recente informații. Acest sfat se poate schimba în cazul apariției unui focar de COVID-19 în zona dvs. locală. S-ar putea să aveți în continuare nevoie de un test COVID-19 dacă îndepliniți alte criterii, de exemplu, dacă sunteți un contact apropiat al unui caz de COVID-19 cunoscut. Dacă aveți dubii, solicitați o evaluare medicală.

## **Nu uitați a doua programare**

Este important să vi se administreze două doze de vaccin COVID-19 Pfizer. Aceste doze sunt, în general, administrate la distanță de 3-6 săptămâni, dar pot fi recomandate intervale mai lungi în circumstanțe speciale. A doua doză va prelungi probabil durata protecției împotriva COVID-19.

## **Cum sunt utilizate informațiile pe care le furnizați la programarea dvs.**

Pentru informații despre modul în care sunt colectate, stocate și utilizate datele dvs. personale vizitați: <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>