



Australian Government

COVID-19
VACCINATION

接種 Spikevax (Moderna) COVID-19 疫苗後

最後更新日期：2021 年 9 月 2 日

關於疫苗

今天您接種了 **Spikevax (Moderna)** 疫苗。

這疫苗可以防止因感染 COVID-19 而患病。莫德納 (Moderna) COVID-19 疫苗不含任何活病毒，因此不會使您感染 COVID-19。它含有 SARS-CoV-2 病毒重要部份的遺傳密碼，稱為刺突蛋白。接種疫苗後，您的身體會複製刺突蛋白。然後，您的免疫系統將學會識別和抵禦 SARS-CoV-2 病毒。遺傳密碼會被身體迅速分解。

接種疫苗後可預期什麼

與任何疫苗一樣，您在接種 COVID-19 疫苗後可能會出現一些副作用。

接種莫德納後常見的副作用包括：

- 注射部位疼痛
- 疲倦
- 頭痛
- 肌肉疼痛
- 發燒和發冷
- 關節痛。

接種莫德納後不常見的副作用包括：

- 注射部位發紅或腫脹
- 腋窩腫脹或觸痛
- 噁心 / 嘔吐
- 淋巴結腫大。

這些副作用通常輕微，通常會在兩三天內消失。與其他常見的疫苗相比，有些人會因接種此疫苗而出現更嚴重的類似流感症狀，並且可能需要遠離正常活動一段時間。這些症狀可能在第一劑或第二劑後出現，但在第二次劑後更常見。

若您在接種疫苗後出現注射部位疼痛或發燒、頭痛或身體疼痛，您可以服用撲熱息痛 (paracetamol) 或布洛芬 (ibuprofen)。這些有助於減輕上述一些症狀。您無需接種疫苗前服用撲熱息痛或布洛芬。若注射部位腫脹，可以使用冷敷。

接獲接種莫德納後報告的罕見副作用有：

- 嚴重過敏反應（過敏性休克）。
- 心肌炎 (Myocarditis) 和心包炎 (pericarditis, 心臟外膜發炎)。大多數報告的病例都是輕微並且很快康復，然而這些病例的長期跟進仍在進行。病例主要發生在第二劑後，主要是年輕（30 歲以下）男性。

在接種疫苗後若出現以下情況，您應該就醫：

- 您認為自己有過敏反應。若您出現呼吸困難、氣喘、心跳加快或昏倒等嚴重症狀，請致電 000
- 您的胸口感到疼痛、受壓或不適、心律不齊、心跳漏拍或「顫動」、昏厥、氣促或呼吸疼痛
- 您擔心有可能出現副作用，或有新的或意想不到的症狀
- 這疫苗預期會有的副作用出現在您身上，幾天後仍未消失。

對於非緊急症狀，您可以諮詢您的日常醫療服務提供者（通常是您的家庭醫生）。

疫苗安全監測和報告副作用

您可以將懷疑出現的副作用向您的疫苗接種供應商或其他醫療服務專業人員報告。然後，他們會代表您向您的州或領地衛生部門或直接向治療產品管理局 (Therapeutic Goods Administration, TGA) 提交正式報告。

若您希望自己提出報告，請瀏覽 TGA 網站內[報告與 COVID-19 疫苗相關可疑副作用的頁面](#)，並按照頁面指示操作。

接種疫苗後的 COVID-19 檢測

接種 COVID-19 疫苗的某些副作用可能類似 COVID-19 症狀（例如發燒），然而莫德納不含任何活病毒並且不能引致 COVID-19。在以下情況下，您可能無須接受 COVID-19 檢測或隔離：

- 若在接種疫苗後的首兩天出現發燒、頭痛或疲倦等一般症狀，並且
- 您確定自己沒有任何呼吸道症狀（例如流鼻涕、咳嗽、喉嚨痛、喪失嗅覺或喪失味覺）。

然而，您應該查看您所在州 / 領地的現有指引，以取得最新資料。若您所在地區爆發 COVID-19，此建議可能會有變。若您符合其他條件，您可能仍需要接受 COVID-19 檢測，例如您與已知的 COVID-19 個案有密切接觸。若有疑問，請尋求醫療評估。

記住你的第二次約會

重要的是，您需要接種兩劑莫德納疫苗，一般相隔 4 至 6 星期，若是特殊情況可能會建議相隔時間更長。第二劑疫苗非常可能可以延長保護，防止感染 COVID-19 的時間。

您應約時所提供的資料會被如何使用

有關如何收集、儲存和使用您的個人詳細資料的資訊，請瀏覽 <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>