



Australian Government



Nakon cijepljenja protiv COVID-19 Spikevax (Moderna) cjepivom

Zadnji put ažurirano: 2. rujna 2021.

O cjevivu

Danas ste primili **Spikevax (Moderna) cjevivo**.

Ovo cjevivo može spriječiti oboljevanje od COVID-19. Moderna cjevivo protiv COVID-19 ne sadrži živi virus i od njega ne možete dobiti COVID-19. Cjevivo sadrži genetički kod za važan dio SARS-CoV-2 virusa pod nazivom šiljasti protein. Nakon cijepljenja, organizam proizvodi kopije šiljastog proteina. Uslijed toga, organizam 'nauči' prepoznati SARS-CoV-2 virus koji izaziva COVID-19 i boriti se protiv njega. Organizam brzo razlaže genetički kod.

Što možete očekivati nakon cijepljenja

Kao što je to slučaj kod svih cjeviva, i nakon cijepljenja protiv COVID-19 možete dobiti neke nuspojave.

Uobičajene nuspojave nakon cijepljenja **Modernom** uključuju:

- bol na mjestu uboda injekcije
- umor
- glavobolju
- bolove u mišićima
- vrućicu i zimicu
- bolove u zglobovima.

Rjeđe nuspojave nakon **Moderne** uključuju:

- crvenilo ili otok na mjestu uboda injekcije
- otok ili osjetljivost ispod pazuha
- mučninu / povraćanje
- povećane limfne čvorove.

Te nuspojave su obično blage i prolaze u roku od dva do tri dana. Neke osobe će od ovog cjepiva dobiti simptome slične simptomima gripe koji će biti značajniji u usporedbi sa simptomima koji se javljaju nakon drugih uobičajenih cjepiva i neće moći obavljati svoje svakodnevne aktivnosti. Ti simptomi se mogu javiti nakon bilo koje doze, ali se češće javljaju nakon druge doze.

Ako nakon cijepjenja dobijete bol na mjestu uboda injekcije ili vrućicu, glavobolju ili bolove u cijelom tijelu, možete uzeti paracetamol ili ibuprofen koji će ublažiti neke od tih simptoma. Prije cijepjenja ne trebate uzeti paracetamol ili ibuprofen. Ako na mjestu uboda injekcije nastane otok, možete staviti hladne obloge.

Rijetke nuspojave koje su prijavljene nakon **Moderne** su:

- ozbiljna alergijska reakcija (anafilaksija).
- miokarditis (upala srčanog mišića) i perikarditis (upala srčane ovojnice). U većini prijavljenih slučajeva su te nuspojave bile blage i oporavak je brzo uslijedio, mada je dugoročno praćenje tih slučajeva još uvijek u tijeku. Te nuspojave se javljaju uglavnom nakon druge doze i pretežito kod mlađih muškaraca (mlađih od 30 godina).

Trebate zatražiti medicinsku pomoć ako nakon cijepjenja:

- smatrate da imate alergijsku reakciju. Nazovite 000 ako dobijete ozbiljne simptome, na primjer otežano disanje, hriptanje, ubrzan rad srca ili ako kolapsirate
- dobijete bolove u prsima, pritisak ili neugodan osjećaj, neredovne otkucaje srca, preskakanje ili 'treperenje' srca, ako izgubite svijest, otežano dišete ili vas boli kada dišete
- zabrinuti ste zbog potencijalne nuspojave ili imate nove i neočekivane simptome
- dobijete očekivanu nuspojavu cijepjenja koja ne nestaje nakon nekoliko dana.

Za simptome koji nisu hitne prirode se možete obratiti vašem redovitom zdravstvenom djelatniku (obično je to liječnik opće prakse).

Praćenje sigurnosti cjepiva i prijavljivanje nuspojava

Nuspojave na koje sumnjate da su nastale od cijepjenja možete prijaviti zdravstvenom djelatniku za cijepjenje ili drugom zdravstvenom djelatniku. Oni će prijaviti nuspojave u vaše ime državnom ili teritorijalnom ministarstvu zdravstva ili izravno upravi TGA.

Ako sami želite prijaviti nuspojave, posjetite internetske stranice uprave TGA - [reporting suspected side effects associated with a COVID-19 vaccine webpage](#) – i slijedite naputke na toj stranici.

Testiranje na COVID-19 nakon cijepjenja

Neke nuspojave cjepiva protiv COVID-19 mogu biti slične simptomima COVID-19 (npr. vrućica). Međutim, Moderna ne sadrži živi virus i od nje ne možete dobiti COVID-19. Možda se nećete morati testirati na COVID-19 i izolirati:

- ako u prva dva dana nakon cijepjenja dobijete samo općenite simptome, kao što su vrućica, glavobolja ili umor, i
- ako nemate respiracijske simptome (npr. ne curi vam nos, ne kašljete, ne boli vas grlo i niste izgubili osjet mirisa ili okusa).

Međutim, za ažurirane informacije ipak trebate provjeriti smjernice državnih / teritorijalnih zdravstvenih vlasti koje su trenutačno na snazi. Preporuke se mogu promijeniti ako na vašem području izbije COVID-19 epidemija. Možda ćete se morati testirati na COVID-19 ako

ispunjavate druge kriterije, na primjer ako ste bliski kontakt potvrđenog COVID-19 slučaja. Ako niste sigurni, zatražite liječnički pregled.

Ne zaboravite da trebate otići i na drugu dozu

Važno je primiti dvije doze Moderna cjeviva. Dvije doze tog cjeviva se obično daju u razmaku od 4 do 6 tjedana, ali se u posebnim okolnostima mogu preporučiti dulji razmaci. Druga doza vjerojatno produžuje zaštitu od COVID-19.

Kako se koriste informacije koje date prigodom cijepljenja

Za informacije o prikupljanju, čuvanju i uporabi vaših osobnih podataka, posjetite <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>