



Australian Government

COVID-19  
VACCINATION

# ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສັກຢາຕ້ານ

## COVID-19 Spikevax (Moderna)

ອັບເດດຄັ້ງລ່າສຸດ: 2 ກັນຍາ 2021

### ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນຊະນິດນີ້

ນີ້ ທ່ານກໍໄດ້ຮັບການສັກ ຢາວັກຊີນສະໄປໂຄ້ແວກສ໌ (ມໍເດີນນາ) [Spikevax (Moderna)] ແລ້ວ.

ຢາວັກຊີນຊະນິດນີ້ສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນເຈັບປ່ວຍຈາກພະຍາດ COVID-19. ຢາວັກຊີນ Moderna COVID-19 ບໍ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງເຊື້ອໄວຣັສທີ່ມີຊີວິດແຕ່ຢ່າງໃດ, ແລະມັນກໍບໍ່ສາມາດເອົາເຊື້ອ COVID-19 ໃຫ້ທ່ານໄດ້. ຢານີ້ປະກອບດ້ວຍລະຫັດພັນທຸກຳສຳລັບພາກສ່ວນອັນສຳຄັນຂອງເຊື້ອໄວຣັສ SARS-CoV-2 ທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂປຣຕີນທີ່ແຫຼມຄົມ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນແລ້ວ, ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກໍຈະເຮັດກອບປີ້ເອົາໂປຣຕີນທີ່ແຫຼມຄົມນີ້ຂຶ້ນມາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລະບົບຄຸ້ມກັນຂອງທ່ານກໍຈະຮຽນຮູ້ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກແລະຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໄວຣັສ SARS-CoV-2 ນີ້. ລະຫັດພັນທຸກຳຈະແຍກສະຫຼາຍຕົວໂດຍໄວໂດຍຮ່າງກາຍ.

### ສິ່ງທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສັກຢາ

ເຊັ່ນດຽວກັບຢາວັກຊີນຊະນິດອື່ນໆ, ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າມີອາການຂ້າງຄຽງບາງຢ່າງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຕ້ານ COVID-19.

ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ ມັກເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປ ຫຼັງຈາກສັກຢາ Moderna ລວມມີ:

- ປວດຢູ່ບ່ອນຮອຍສັກຢາ
- ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ
- ເຈັບຫົວ
- ປວດຕາມກ້າມຊີ້ນ
- ເປັນໄຂ້ແລະໜາວສັນ
- ປວດຕາມຂີ້.

## ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ ບໍ່ຄ່ອຍເປັນ ຫຼັງຈາກສັກຢາ Moderna ລວມມີ:

- ເປັນຮອຍແດງຫຼືໃຄ່ຢູ່ບ່ອນຮອຍສັກຢາ
- ໃຄ່ຫຼືເຈັບຢູ່ກ້ອງຂີ້ແຮ້
- ປວດຮາກ/ຮາກ
- ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

ອາການຂ້າງຄຽງເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິຈະເປັນພຽງເບົາບາງແລະປົກກະຕິກໍຈະຫາຍໄປເອງພາຍໃນສອງຫຼືສາມມື້. ບາງຄົນອາດຮູ້ສຶກຄ້າຍກັບວ່າມີອາການຂອງໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ແຮງ ຈາກຢາວັກຊີນຂະນິດນີ້ເມື່ອທຽບກັບຢາວັກຊີນອື່ນໆທົ່ວໄປ ແລະອາດຕ້ອງໄດ້ພັກຈາກກິດຈະກຳທີ່ເຮັດຕາມປົກກະຕິ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼັງຈາກສັກຢາໂດສທຳອິດຫຼືໂດສທີສອງ ແຕ່ວ່າ ສ່ວນມາກມັກຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກໂດສທີສອງ.

ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກປວດຢູ່ບ່ອນຮອຍສັກຢາ ຫຼື ເປັນໄຂ້ ເຈັບຫົວ ຫຼື ປວດຕາມຮ່າງກາຍ ຫຼັງຈາກສັກຢາແລ້ວ, ທ່ານສາມາດກິນຢາ paracetamol ຫຼື ibuprofen. ຢາເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການຂ້າງເທິງບາງຢ່າງ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກິນຢາ paracetamol ຫຼື ibuprofen ກ່ອນໄປສັກຢາວັກຊີນ. ຖ້າມີການໃຄ່ຢູ່ບ່ອນຮອຍສັກຢາ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຜ້າເຢັນຂົມໄວ້.

## ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນຍາກທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານ ຫຼັງຈາກສັກຢາ Moderna ແມ່ນ:

- ມີປະຕິກິລິຍາພູມແພ້ຢ່າງແຮງ (anaphylaxis).
- Myocarditis (ການອັກເສບຂອງກ້າມຂັ້ນຫົວໃຈ) ແລະ pericarditis (ການອັກເສບຂອງຖົງຫຸ້ມຫົວໃຈ). ກໍລະນີທີ່ຖືກລາຍງານແມ່ນເປັນພຽງເບົາບາງແລະຫາຍໄປເອງໂດຍໄວ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມເບິ່ງກໍລະນີດັ່ງກ່າວ. ກໍລະນີທີ່ກ່າວມາມັກເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສັກຢາໂດສທີສອງແລະມັກເກີດຂຶ້ນກັບຊາຍໜຸ່ມ (ອາຍຸ < 30 ປີ).

ທ່ານຕ້ອງໄປໃຫ້ແພດເບິ່ງອາການຫຼັງຈາກສັກວັກຊີນ ຖ້າວ່າ:

- ທ່ານຄິດວ່າທ່ານກຳລັງມີປະຕິກິລິຍາພູມແພ້. ໃຫ້ໂທຫາ 000 ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີອາການທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເຊັ່ນຫາຍໃຈຝືດ, ຫາຍໃຈດັ່ງວິດໆ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ຫຼື ໜ້າມືດ
- ທ່ານຮູ້ສຶກເຈັບ, ແໜ້ນ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍ ທີ່ໜ້າເອິກ, ບາດເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ຫຼື 'ບາດຢຸດບາດເຕັ້ນ', ເປັນລົມ, ຫາຍໃຈຝືດ ຫຼື ຮູ້ສຶກເຈັບເວລາຫາຍໃຈ
- ທ່ານກັງວົນກ່ຽວກັບອາການຂ້າງຄຽງໃດໜຶ່ງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ມີອາການໃໝ່ ຫຼື ອາການທີ່ບໍ່ຄາດມາກ່ອນ
- ທ່ານມີອາການຂ້າງຄຽງຈາກຢາວັກຊີນທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ, ແຕ່ວ່າອາການນັ້ນບໍ່ຫາຍໄປຫຼັງຈາກສອງສາມມື້ແລ້ວ.

ສຳລັບອາການທີ່ບໍ່ຮີບດ່ວນ, ທ່ານສາມາດໄປພົບຜູ້ດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານທີ່ເຄີຍໄປຫາເປັນປະຈຳ (ປົກກະຕິຈະແມ່ນ GP ຂອງທ່ານ).

## ການຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນແລະການລາຍງານອາການຂ້າງຄຽງ

ທ່ານສາມາດລາຍງານອາການຂ້າງຄຽງທີ່ສົງໄສ ກັບຜູ້ສັກຢາໃຫ້ທ່ານຫຼືແພດດູແລສຸຂະພາບຄົນອື່ນໆ. ເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການຕາງໜ້າທ່ານຫາກະຊວງສາທາລະນະສຸກຢູ່ໃນລັດທີ່ເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານ ຫຼື ລາຍງານໂດຍຕົງທາງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວ (TGA).

ຖ້າທ່ານປະສົງຢາກເຮັດລາຍງານດ້ວຍຕົນເອງ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ [ເວັບເພຊ ສຳລັບລາຍງານອາການຂ້າງຄຽງທີ່ສົງໄສເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັກວັກຊີນຕ້ານ COVID-19](#) ຫຼື ໄປທີ່ເວັບໄຊຂອງ TGA ແລະເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້ານັ້ນ.

## ການກວດຫາເຊື້ອ COVID-19 ຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ

ບາງອາການຂ້າງຄຽງຈາກການສັກວັກຊີນຕ້ານ COVID-19 ອາດຄ້າຍຄືກັນກັບອາການຂອງ COVID-19 ເອງ (ເຊັ່ນ ເປັນໄຂ້). ຢ່າງໃດກໍດີ, Moderna ບໍ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງເຊື້ອໄວຣັສທີ່ມີຊີວິດໃດໆ ແລະ ບໍ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດ COVID-19. ທ່ານອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປເຮັດການກວດຫາເຊື້ອ COVID-19 ຫຼືແຍກປ່ຽວ:

- ຖ້າວ່າທ່ານເກີດມີອາການທົ່ວໆໄປເຊັ່ນເປັນໄຂ້, ເຈັບຫົວ ຫຼື ຮູ້ສຶກເມື່ອຍພາຍໃນສອງມື້ທຳອິດຫຼັງຈາກສັກຢາ, ແລະ
- ຖ້າວ່າທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານບໍ່ມີອາການຂອງທາງເດີນຫາຍໃຈໃດໆ (ເຊັ່ນ ນ້ຳມູກໄຫຼ, ໄອ, ເຈັບຄໍ, ບໍ່ຮູ້ກິນ ແລະລົດຊາດອາຫານ).

ຢ່າງໃດກໍດີ, ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງຂໍ້ແນະນຳອັນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນລັດ/ເຂດປົກຄອງຂອງທ່ານ ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຖືກອັບເດດລ່າສຸດ. ຄຳແນະນຳນີ້ອາດປ່ຽນແປງໄປ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດມີການແພ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ຢູ່ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຈະຍັງຕ້ອງໄປເຮັດການກວດຫາເຊື້ອ COVID-19 ຖ້າວ່າທ່ານຕົກເຂົ້າເງື່ອນໄຂຢ່າງອື່ນ, ຕົວຢ່າງ ຖ້າວ່າທ່ານເປັນຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19. ຖ້າສິ່ງໄສ, ໃຫ້ໄປຫາແພດເພື່ອກວດເບິ່ງອາການ.

### ໃຫ້ຈື່ການນັດໝາຍຄັ້ງທີສອງຂອງທ່ານ

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາ Moderna ສອງໂດສ. ຢາສອງໂດສນີ້ໂດຍທົ່ວໄປຈະສັກໃຫ້ໂດຍທ່າງກັນ 4-6 ອາທິດ, ແຕ່ວ່າອາດຈະແນະນຳໃຫ້ສັກທ່າງກັນດົນກວ່ານັ້ນໃນກໍລະນີພິເສດ. ການໄດ້ສັກຢາໂດສທີສອງມີແນວໂນ້ມວ່າຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງທ່ານ ຈາກ COVID-19 ເປັນລະຍະເວລາໄດ້ດົນຂຶ້ນ.

### ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ສະໜອງໃຫ້ທີ່ບ່ອນນັດສັກຢາຈະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງໃດ

ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ວ່າລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບກຳ, ຮັກສາໄວ້ແລະນຳໃຊ້ຢ່າງໃດນັ້ນ ຂໍໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງ <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>