



Australian Government

COVID-19
VACCINATION

तपाईंको Spikevax (Moderna) COVID-19 खोप पछि

अन्तिम संस्करण: २ सेप्टेम्बर २०२१

खोपको बारेमा

आज तपाईंले **Spikevax (Moderna) खोप** लगाउनु भयो।

यो खोपले मानिसहरूलाई COVID-19 बाट बिरामी हुनबाट रोक्न सक्छ। Moderna COVID-19 खोपमा कुनै जीवित भाइरस समावेश गर्दैन, र यसले तपाईंलाई COVID-19 दिन सक्दैन। यसमा SARS-CoV-2 भाइरसको एक महत्वपूर्ण भाग संलग्न हुन्छन् जसलाई आनुवंशिक कोड स्पाइक प्रोटीन भनिन्छ। खोप लगाए पछि, तपाईंको शरीरले स्पाइक प्रोटीनको प्रतिलिपि बनाउँदछ। तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीले त्यसपछि SARS-CoV-2 भाइरस चिन्न र त्यसको विरुद्ध लड्न जान्छन्। आनुवंशिक कोड शरीरले छिटो टुक्र्याँदछ।

खोप लगाएपछि के अपेक्षा गर्न सकिन्छ

अन्य कुनैपनि खोपहरू जस्तै, COVID-19 खोप लगाएपछि तपाईंलाई केहि साईड ईफेक्टहरू हुन सक्दछन्।

Moderna लगाएपछिको सामान्य साईड ईफेक्टहरू निम्न छन्:

- सूईलगाएको ठाउँमा दुख्ने
- थकाईको महसुस हुने
- टाउको दुख्ने
- मांसपेशी दुख्ने
- ज्वरोको र चिसो अनुभव हुने
- जोड्नी दुख्ने।

Moderna लगाएपछिको न्यून सामान्य साईड ईफेक्टहरू निम्न छन्:

- सूई लगाएको ठाउँमा रातो हुने वा सुन्निने
- काखीमा सुन्निने तथा कोमलताको महसुस हुने
- रिंगटा / बान्ता आउने
- लिम्फनोडहरू फुल्ने।

यी साईड ईफेक्ट सामान्यतया हल्का हुन्छन् र सामान्यतया दुई वा तीन दिन भित्र हराएर जान्छन्। केहि मानिसहरूलाई अन्य सामान्य खोपहरूको तुलनामा यो खोपबाट भन्दा बढी रुघाको जस्तै लक्षणको अनुभव हुनेछ र सामान्य गतिविधिहरूबाट छुट्टी लिन आवश्यकता पर्न सक्छ। यी लक्षणहरू कुनैपनि मात्रा लगाएपछि हुन सक्छ तर दोस्रो मात्रा पछि धेरै सामान्य छन्।

यदि तपाईं सूई लगाएको ठाउँमा दुखेको वा ज्वरो, टाउको दुखेको वा खोप पछि शरीर दुखेको अनुभव गर्नुभएमा, तपाईं प्यारासिटामोल वा ibuprofen लिन सक्नुहुन्छ। यसले माथि उल्लेखित लक्षणहरूलाई केहि कम गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंले खोप लगाउनु अघि प्यारासिटामोल वा ibuprofen लिनु पर्दैन। यदि त्यहाँ सूई लगाएको ठाउँमा सुन्नियो भने, तपाईंले एउटा चिसो कम्प्रेसको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

Moderna लगाएपछीको **विरलै** हुने साईड इफेक्टहरू निम्न रिपोर्ट गरिएकाछन्:

- गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया (एनाफिलेक्सिस)।
- Myocarditis (मुटुको मांसपेशी सुन्निने) र pericarditis (मुटुको बाहिरी झिल्ली सुन्निने)। धेरै जसो रिपोर्ट गरिएका केसहरूमा हल्का र छिट्टै निको भएको देखिएको छ, यद्यपि यी मामिलाहरूको दीर्घकालीन अनुगमन भने जारी नै छन्। घटनाहरू मुख्य रूपमा दोस्रो मात्रा लगाए पछि र मुख्य रूपमा युवा पुरुषहरू (उमेर <30 वर्ष) मा हुन्छन्।

यदि तपाईंलाई खोप पछि निम्न भएमा चिकित्सा ध्यानाकर्षण गरिनु पर्दछ:

- तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले एलर्जीको प्रतिक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं गम्भीर लक्षणहरू अनुभव गर्नुहुन्छ, यदि सास फेर्न कठिनाई, स्वाँ स्वाँ हुने, मुटुको धड्कन छिटो छिटो हुने वा ढल्ला जस्तै अनुभव गर्नुहुने
- तपाईंलाई छाती दुक्ने, थिचेको वा असजिलो अनुभव, अनियमित मुटुको धड्कन, धड्कन रोकिँदै हुने वा 'बडबड(fluttering)', बेहोशी, सास फेर्न गाह्रो वा सास फेर्दा दुख्ने
- तपाईं सम्भावित साइड इफेक्टको वा नयाँ वा अप्रत्याशित लक्षणहरूको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ
- तपाईंको खोप लगाएपछी अपेक्षित साइड इफेक्ट भएको छ, जुनचाँही केहि दिन पछि टपनि हराएर गएको छैन।

जरुरी नभएको लक्षणहरूको लागी, तपाईंले आफ्नो नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक (सामान्यतया तपाईंको जीपी)लाई भेट्न सक्नुहुन्छ।

खोपको सुरक्षाको बारेमा निगरानी र साईड इफेक्टहरू रिपोर्ट गर्ने

तपाईंले आफ्नो खोप प्रदायक वा अन्य स्वास्थ्य पेशेवर लाई संदिग्ध साइड इफेक्टहरू रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछी उनीहरूले तपाईंको अनुरोधमा तपाईंको राज्य वा क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभाग वा सीधै चिकित्सीय सामान प्रशासन (Therapeutic Goods Administration)(TGA) लाई औपचारिक रिपोर्ट बनाउनेछन्।

यदि तपाईं यसलाई आफैं रिपोर्ट गर्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया [रिपोर्टिंग COVID-19 संग संदिग्ध साइड इफेक्ट खोपको वेभाईट\(Reporting suspected side effects associated with a COVID-19 vaccine webpage\)](#) TGA वेबसाइट मा जानुहोस् र पृष्ठमा दिएको निर्देशहरू को पालन गर्नुहोस्।

खोप लगाएपछीको COVID-19 परीक्षण

COVID-19 खोपबाट केही साइड इफेक्टहरू COVID-19 (जस्तै ज्वरो) को लक्षण जस्तै हुन सक्छ। जे होस्, Moderna मा कुनै जीवित भाइरस समावेश छैन र COVID-19 लाग्न सक्दैन। तपाईंले COVID-19 परीक्षण गरिनु पर्ने वा पृथक रहनको लागी आवश्यक नहुन सक्छ:

- यदि तपाईं खोप पछिको पहिलो दुई दिनमा सामान्य लक्षणहरू जस्तै ज्वरो, टाउको दुखाइ वा थकान विकास गर्नु भएमा, र
- यदि तपाईं निर्धक्क हुनुहुन्छ कि तपाईंलाई कुनै श्वासप्रश्वासको लक्षण छैन (जस्तै नाकबाट पानी बग्नु, खोकी, घाँटी दुख्नु, गन्ध हराउनु वा स्वाद हराउनु)।

यहपी, तपाईं सबैभन्दा हालसाविक जानकारीको लागी तपाईंको राज्य/क्षेत्रमा वर्तमान दिशानिर्देशहरूको जाँच गर्नु पर्छ। यो सल्लाह तपाईंको स्थानीय क्षेत्रमा एक COVID-19 प्रकोपको घटना भएमा परिवर्तन हुनसक्छ। यदि तपाईं अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुहुन्छ भने तपाईं अझै पनि एक COVID-19 परीक्षण प्राप्त गर्न को लागी आवश्यक हुन सक्छ, उदाहरण को लागी यदि तपाईं एउटा ज्ञात COVID-19 मामलाको नजिकको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यदि शंका लागेको छ भने, चिकित्सा मूल्याङ्कन गरिनुहोला।

तपाईंको दोश्रो पटकको भेट्ने समय याद गर्नुहोस्

यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईं Moderna को दुई मात्रा लगाउनु पर्नेछ। यी मात्राहरू सामान्यतया ४-६ हप्ताको फरकमा दिईन्छ, तर विशेष परिस्थितिहरूमा लामो अन्तराल सिफारिश गर्न सकिन्छ। दोस्रो मात्राले COVID-19 को बिरुद्ध सुरक्षाको अवधि लम्ब्याउने सम्भावना हुन्छ।

तपाईंको भेटको बेलामा उपलब्ध गराउनु भएको जानकारीहरूलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ

तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी कसरी संकलन, भण्डार र प्रयोग कसरी गरिनेछ भन्ने बारे थप जानकारीको लागि

<https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations> मा हेर्नुहोला।