



Australian Government

COVID-19
✓ **VACCINATION**

După vaccinarea COVID-19 Spikevax (Moderna)

Ultima actualizare: 2 septembrie 2021

Despre vaccin

Astăzi ați făcut vaccinul **Spikevax (Moderna)**.

Acest vaccin poate împiedica îmbolnăvirea de COVID-19. Vaccinul COVID-19 Moderna nu conține niciun virus viu și nu poate da boala COVID-19. Acesta conține codul genetic al unei părți importante a virusului SARS-CoV-2 numită proteina spike. După obținerea vaccinului, corpul face copii ale proteinei spike. Sistemul imunitar va învăța apoi să recunoască și să lupte împotriva virusului SARS-CoV-2. Codul genetic este defalcat rapid de către organism.

La ce să vă așteptați după vaccinare

Ca în cazul oricărui vaccin, este posibil să aveți unele reacții adverse după ce ați primit un vaccin COVID-19.

Reacții adverse **obișnuite** după **Moderna** includ:

- durere la locul injectării
- oboseală
- dureri de cap
- dureri musculare
- febră și frisoane
- dureri articulare.

Efecte secundare **mai puțin frecvente** după **Moderna** includ:

- roșeață sau umflare la locul injectării
- umflătură sau sensibilitate la subsoară
- greață/vărsături
- ganglioni limfatici măriți.

Aceste efecte secundare sunt de obicei ușoare și, de obicei, dispar în termen de două sau trei zile. Unii oameni vor experimenta mai multe simptome semnificative asemănătoare gripei de la această vaccinare în comparație cu alte vaccinări obișnuite și pot necesita ca dvs. să renunțați un timp la activitățile normale. Aceste simptome pot apărea după oricare dintre doze, dar sunt mai frecvente după a doua doză.

Dacă aveți dureri la locul injectării sau febră, dureri de cap sau dureri corporale după vaccinare, puteți lua paracetamol sau ibuprofen. Acestea ajută la reducerea unora dintre simptomele de mai sus. Nu trebuie să luați paracetamol sau ibuprofen înainte de vaccinare. Dacă vor apărea umflături la locul injectării, puteți aplica o compresă rece.

Reacții adverse **rare** care au fost raportate după **Moderna** sunt:

- Reacție alergică severă (anafilaxie).
- Miocardită (inflamația mușchiului cardiac) și pericardită (inflamația mucoasei exterioare a inimii). Cele mai multe cazuri raportate au fost ușoare și s-au recuperat rapid, deși monitorizarea pe termen mai lung a acestor cazuri este în curs de desfășurare. Cazurile apar predominant după a doua doză și predominant la bărbații mai tineri (cu vârsta < 30 de ani).

Trebuie să solicitați asistență medicală după vaccinare dacă:

- Credeți că aveți o reacție alergică. Sunați la 000 dacă aveți simptome severe cum ar fi dificultăți de respirație, respirație șuierătoare, bătăi rapide ale inimii sau colapsuri
- Aveți dureri în piept, presiune sau disconfort, bătăi neregulate ale inimii, bătăi omise sau senzație de "fluturare", leșin, dificultăți de respirație sau durere atunci când respirați
- Sunteți îngrijorat de un potențial efect secundar sau aveți simptome noi sau neașteptate
- Aveți un efect secundar așteptat al vaccinului care nu a dispărut după câteva zile.

Pentru simptome care nu sunt urgente, puteți vedea furnizorul obișnuit de asistență medicală (de obicei, medicul de familie).

Monitorizarea siguranței vaccinului și raportarea efectelor secundare

Puteți raporta efectele secundare suspectate furnizorului de vaccinare sau altui profesionist din domeniul sănătății. Ei vor face apoi un raport oficial în numele dumneavoastră la departamentul de sănătate de stat sau de teritoriu sau direct la Administrația Bunurilor Terapeutice (TGA).

Dacă preferați să raportați dvs. înșivă, vă rugăm să vizitați [pagina web de raportare a efectelor secundare suspectate asociate cu un vaccin COVID-19](#) pe site-ul TGA și să urmați instrucțiunile de pe pagină.

Testarea de COVID-19 după vaccinare

Unele reacții adverse ale vaccinării COVID-19 ar putea fi similare cu simptomele COVID-19 (de exemplu, febra). Cu toate acestea, Moderna nu conține niciun virus viu și nu poate provoca boala COVID-19. S-ar putea să nu fie nevoie să faceți un test COVID-19 sau să vă izolați:

- Dacă dezvoltăți simptome generale cum ar fi febră, dureri de cap sau oboseală în primele două zile după vaccinare, și
- Dacă sunteți sigur că nu aveți simptome respiratorii (de exemplu, nas care curge, tuse, durere în gât, pierderea mirosului sau pierderea gustului).

Cu toate acestea, ar trebui să verificați instrucțiunile actuale din statul/teritoriul dvs. pentru a afla cele mai recente informații. Acest sfat se poate schimba în cazul apariției unui focar de COVID-19 în zona dvs. locală. S-ar putea să fie necesar să mai faceți un test COVID-19 dacă îndepliniți alte criterii, ca de exemplu, dacă sunteți un contact apropiat al unui caz cunoscut de COVID-19. Dacă aveți îndoieli, solicitați o evaluare medicală.

Amintiți-vă de a doua programare

Este important să primiți două doze de Moderna. Aceste doze sunt, în general administrate la un interval de 4-6 săptămâni, dar se pot recomanda intervale mai lungi în circumstanțe speciale. A doua doză este de natură să prelungească durata protecției împotriva COVID-19.

Cum sunt utilizate informațiile pe care le furnizați la programare

Pentru informații despre modul în care datele dvs. personale sunt colectate, stocate și utilizate, vizitați <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>