



Australian Government

**COVID-19**  
✓ **VACCINATION**

# Después de su vacunación del COVID-19 – Spikevax (Moderna)

Última actualización: 2 de septiembre de 2021

## Acerca de la vacuna

Hoy recibió la **vacuna Spikevax (Moderna)**.

Esta vacuna puede evitar que las personas se enfermen por el COVID-19. La vacuna contra el COVID-19 de Moderna no contiene ningún virus vivo y no puede contagiarle el COVID-19. Contiene el código genético de una parte importante del virus SARS-CoV-2 llamada proteína de espiga. Después de vacunarse, su organismo hace copias de la proteína de espiga. Luego, su organismo aprenderá a reconocer y luchar contra el virus SARS-CoV-2. El código genético es descompuesto rápidamente por el organismo.

## Qué esperar después de la vacunación

Al igual que con cualquier vacuna, puede tener algunos efectos secundarios después de vacunarse contra el COVID-19.

Entre los efectos secundarios **comunes** después de la aplicación de **Moderna** se encuentran:

- dolor en el lugar de la inyección
- cansancio
- dolor de cabeza
- dolor muscular
- fiebre y escalofríos
- dolor en las articulaciones.

Entre los efectos secundarios **menos comunes** después de la aplicación de **Moderna** se encuentran:

- enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección
- hinchazón o sensibilidad en la axila
- náuseas/vómitos
- ganglios linfáticos agrandados.

Estos efectos secundarios son normalmente leves y suelen desaparecer en dos o tres días. Algunas personas tendrán síntomas más significativos similares a los de la gripe después de

recibir esta vacuna en comparación con otras vacunas comunes, y es posible que necesiten ausentarse de sus actividades normales. Dichos síntomas pueden presentarse después cualquiera de las dos dosis, pero son más comunes después de la segunda dosis.

Si nota dolor en el lugar de la inyección o tiene fiebre, dolor de cabeza o dolores corporales después de la vacunación, puede tomar paracetamol o ibuprofeno. Estos medicamentos ayudan a reducir algunos de esos síntomas. No es necesario tomar paracetamol ni ibuprofeno antes de vacunarse. Si se produce hinchazón en el lugar de la inyección, puede aplicarse una compresa fría.

Los efectos secundarios **raros** notificados después de la vacunación con **Moderna** son los siguientes:

- Reacción alérgica grave (anafilaxia).
- Miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) y pericarditis (inflamación del revestimiento exterior del corazón). Aunque la mayoría de los casos notificados fueron leves y se recuperaron rápidamente, se está realizando un seguimiento a más largo plazo de dichos casos. Los casos ocurren predominantemente después de la segunda dosis y predominantemente en hombres más jóvenes (<30 años).

Debe buscar asistencia médica después de la vacunación si:

- cree que está teniendo una reacción alérgica. Llame al 000 si tiene síntomas graves, como dificultad para respirar, sibilancia, latido cardíaco rápido o lipotimia
- tiene dolor, presión o malestar en el pecho, latidos cardíacos irregulares, latidos saltados o "aleteo", desmayo, dificultad para respirar o dolor al respirar
- le preocupa un posible efecto adverso o tiene síntomas nuevos o inesperados
- sufre alguno de los efectos secundarios esperados de la vacuna que no desaparece después de unos días.

Si los síntomas no son urgentes, puede acudir a su profesional de la salud habitual (normalmente su médico de cabecera (GP)).

## Control de la seguridad de la vacuna y notificación de efectos secundarios

Puede notificar toda sospecha de efectos secundarios a su proveedor de vacunación o a otro profesional de la salud. Ellos los notificarán formalmente en su nombre al departamento de salud de su estado o territorio o directamente a la Administración de Artículos Terapéuticos (TGA).

Si prefiere notificarlo usted mismo, visite la [página web de notificación de sospechas de efectos secundarios asociados a la vacuna contra la COVID-19](#) en el sitio web de la TGA y siga las indicaciones de la página.

## Pruebas de COVID-19 después de la vacunación

Algunos efectos secundarios de la vacunación contra el COVID-19 podrían ser similares a los síntomas del COVID-19 (por ejemplo, fiebre). Sin embargo, Moderna no contiene ningún virus vivo y no puede causar COVID-19. Puede que no tenga que hacerse la prueba del COVID-19 ni aislarse:

- si presenta síntomas generales como fiebre, dolor de cabeza o fatiga los dos primeros días después de recibir la vacuna, y
- si está seguro de no tener síntomas respiratorios (por ejemplo, mucosidad nasal, tos, dolor de garganta, pérdida del olfato o del gusto).

No obstante, deberá consultar las pautas en vigor en su estado o territorio para obtener la información más actualizada. La información puede cambiar en caso de que se produzca un brote de COVID-19 en su zona. Es posible que tenga que hacerse la prueba de COVID-19 si

cumple otros criterios, por ejemplo, si es un contacto cercano de un caso confirmado de COVID-19. En caso de duda, solicite una evaluación médica.

### **Recuerde su segunda cita**

Es importante que reciba dos dosis de Moderna. Generalmente, dichas dosis se administran con un intervalo de 4 a 6 semanas, pero se pueden recomendar intervalos más largos en circunstancias especiales. La segunda dosis puede prolongar la duración de la protección contra el COVID-19.

### **Qué uso se le da a la información que facilita en la cita**

Para obtener información sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus datos personales, visite <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>