



Australian Government



ስለ ስፕሪካቫክስ/Spikevax (ሞደርና/Moderna) ኮቪድ/COVID-19 ክትባት መረጃ

መጨረሻ ወቅታዊ የሆነው፡ ቀን 15 መስከረም/September 2021

ስለ ክትባቱ

ሞደርና (Moderna) ክትባት ሲሆን ይህም ሰዎችን በኮቪድ/COVID-19 ከመታመም መከላከል የሚችል ክትባት ነው። ሁለት ጊዜ መጠን/doses ክትባት መውሰድ እንደሚያስፈልግ፤ ይህም በአብዛኛው ከ4 እስከ 6 ሳምንታት አፈላላይነት (ለየት ባሉ ሁኔታዎች ላይ ረጅም ባሉ ልዩነት) የሚሰጥ ይሆናል። የሞደርና ኮቪድ/Moderna COVID-19 ክትባት ምንም ዓይነት ህይወት ያለው ቫይረስ እንደማይዘና ለኮቪድ/COVID-19 አጋልጦ ሊሰጥዎ አይችልም። ስፕሪካቫክስ spike protein ለተባለ የSARS-CoV-2 ቫይረስ ጠቃሚ የሆነ በራህ ጂኖቲክ ዝርያ መለያ/genetic code እንደያዘ ነው። ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ፤ ሰውነትዎ ለስፕሪካቫክስ spike protein እንዲባዛ ያደርጋል። ከዚያም ለኮቪድ/ COVID-19 ምክንያት የሆነውን SARS-CoV-2 ቫይረስን ለይቶ ለመዋጋት የርስዎ በሽታ መቋቋሚያ ህይድ ይሚጠቅም። በራህ ጂኖቲክ ዝርያ መለያ/genetic code በፍጥነት በሰውነት ይቋረጣል።

ኮቪድ/COVID-19 ለመከላከል የኮቪድ/COVID-19 ክትባት ለማግኘት የሚፈቀድለት በመረጃ ወረቀቱ ካሉት ጥቂት ምክንያቶች ባሻገር እያንዳንዱ ሰው መውሰድ አለበት። ክትባት መውሰድ በፈቃደኛነት ነው። ስለ ኮቪድ/COVID-19 ክትባት መውሰድ በተመለከተ የሚያሳስብ ወይም ጥያቄዎች ካለዎት፤ ክትባቱን ከመውሰድዎ በፊት ከርስዎ ክትባት አቅራቢ እና/ወይም ከአጠቃላይ ህኪምዎ/GP ጋር መነጋገር ነው።

የክትባቱ ጥቅሞች

በጣም ታላቅ በሆኑ ክሊኒካል ሙከራዎች እንዳሳዩት፤ ሞደርና/Moderna ክትባት እድሜያቸው ≥ 12 ዓመት ለሆኑ እና ከዚያ በላይ ለሆኑት ሰዎች በጥሩ ሁኔታ ኮቪድ/COVID-19 እንደሚከላከል ነው። ሁለት መጠን/doses የሞደርና/Moderna ክትባት ከወሰዱት ሰዎች በኮቪድ/ COVID-19 የሚታመሙት ክትባት ካላገኙት ጋር ሲነጻጸር ከመቶ ወደ 94 እጅ ገቅ እንዳለ ነው። እንዲሁም እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ ለሆኑት ሰዎች (86%) እና እድሜያቸው በ 12-17 ዓመት መካከል ላሉ ታዳጊ ወጣቶች ክትባቱ ጥሩ ውጤት እንዳሰጠ ነው።

ሁለተኛ መጠን/dose ኮቪድ/COVID-19 ክትባት የሚጀምረው የመጀመሪያ መጠን/dose ክትባቱን ከወሰዱ ከሁለት ሳምንታት በኋላ ነው። የመጀመሪያ መጠን/dose ክትባት ጥቂት መከላከያ ቢሰጥም፤ ይህ የሚያበቃው ለአጭር ጊዜ ብቻ ሊሆን ይችላል። የሁለተኛ መጠን/dose ክትባቱ ስኬታማ የሆነ መከላከያ ይሰጣል። ከመቶ 100 እጅ ውጤታማ የሚሆን ክትባት ስለሌለ፤ ስለዚህ ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ አሁንም በኮቪድ/ COVID-19 መከላከል መታመም ሊያጋጥምዎት ይችላል። በሞደርና/Moderna ክትባት መከላከያ ለምን ያህል እንደሚቆይ አናውቅም። ስለዚህ ጉዳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንመለከታለን። በአሁን ጊዜ የኮቪድ/COVID-19 ክትባቶች ለቫይረስ ስርጭት መከላከል ምን ያህል ውጤታማ እንደሆኑ በትክክል አናውቅም። ይህ ማለት ሰዎች ክትባት ቢወሰዱም በኮቪድ/ COVID-19 ቫይረስ እንደሚበከሉ እና ምንም እንኳን የበሽታ ምልክቶች ባይኖሩባቸውም ወይም አነስተኛ ምልክቶች ቢታይባቸውም ነገር ግን ቫይረሱን ለሌሎች ሰዎች ሊያስተላልፉ ይችላሉ።

ለዚህ ነው ሌሎች ጠቃሚ የሆኑ መከላከያ እርምጃዎችን መቀጠል ያስፈልገዎታል፡

- የአካል እርቀት
- እጅን መታጠብ
- የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማጥለቅ
- የኮቪድ/COVID-19 ምርመራ ማካሄድ እና እንደ የርስዎ አስተዳደር ግዛት/ተራቶርይ አስፈላጊነት በመገለጫው ቦታ መቆየት ነው።

ሁለቱን መጠን/ doses የሞደርና/Moderna ክትባት ቢወስዱም፤ በአካባቢዎ ባለ የጤና ጥበቃ ባለስልጣን ለምርመራ ቅድመ ሁኔታ መሰረት የሚያሟላ የበሽታ ምልክቶች (ለምሳሌ፡ ትኩሳት፤ ሳል፤ የጉሮሮ ህመም) ካሉ አሁንም ኮቪድ/COVID-19 ምርመራ ማድረግ።

ይህን ክትባት ማን ማግኘት እንደሚችል

እድሜያቸው ≥ 12 ዓመት ለሆኑ ሰዎች የስፒክሻክስ/Spikevax (ሞደርና/Moderna) ክትባትን እንዲጠቀሙ በህክምና ጥራት አስተዳደር (TGA) ጊዜያዊ ፈቃድ እንደሰጠ ነው።

ማን ነው ይህን ክትባት ማግኘት የማይችለው

የሚከተሉት ከነበረብዎት ይህን ክትባት መውሰድ የለብዎትም፡

- ቀደም ብሎ በተሰጠ መጠን/dose የ mRNA COVID-19 ክትባት (ይህም Moderna ወይም Comirnaty (Pfizer)) ላይ አለመስማማት/anaphylaxis (ይህ ከፍተኛ የአለርጂክ ዓይነት) ተፈጥሮ ከነበረ
- በሆነ ቫይረስ ይዘት፤ ለ polyethylene glycol (PEG) ያካተተ ከተጋለጡ በኋላ አለመስማማት/anaphylaxis
- ቀደም ብሎ በተሰጠ መጠን/dose የ mRNA COVID-19 ክትባት (ይህም Moderna ወይም Pfizer) በችግር myocarditis እና/ወይም pericarditis ላይ አስተዋጽኦ አድርጎ ከሆነ
- ልምድ ባለው የበሽታ መከላከያ ክትባት አቅራቢ ወይም በልዩ ህክምና ባለሙያ ግምገማን በመከተል፤ ቀደም ብሎ በተሰጠ መጠን/dose የ mRNA COVID-19 ክትባት (ይህም Moderna ወይም Pfizer) ላይ ምንም ዓይነት ሌላ ከባድ ችግር ካልታወቀ ነው።

ክትባት ለመውሰድ ጥንቃቄዎች

አንዳንድ ሁኔታዎች ላለባቸው ሰዎች ተጨማሪ ጥንቃቄ ሊያስፈልጋቸው ይችላል፤ ይህም እንደ ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ለ30 ደቂቃዎች ክትትል መቆየት ወይም ለአለርጂክ ልዩ ባለሙያ ምክርን ለማግኘት። የሚከተሉት ካሉብዎት ለበሽታ መከላከያ ክትባት አቅራቢ ካለዎት መናገር፡

- ቀደም ሲል በተሰጠ መጠን/dose ወይም በ mRNA COVID-19 ክትባት (ይህም Moderna ወይም Pfizer) ይዘት ላይ የአለርጂ ችግር ተፈጥሮ ከነበረ
- በሌላ ክትባቶች ወይም መድሃኒቶች ላይ አለመስማማት/anaphylaxis መፈጠር። ከሚወስዱት ኮቪድ/ COVID-19 ክትባት ጋር ትክክለኛ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች እንደሌለው ለማረጋገጥ፤ በርስዎ ክትባት አቅራቢ በኩል መጣራት ይችላል
- በአሁኑ ጊዜ ከmastocytosis ችግር ጋር የታወቀ ህክምና የሚያስፈልገው አለመስማማት/anaphylaxis ካለ ነው

የመድማት ችግር ካሉብዎት ወይም የደም ማቅጠኛ መድሃኒት (anticoagulant) የሚወስዱ ከሆኑ፤ ለበሽታ መከላከያ ክትባት አቅራቢ መናገር። በጅምት ውስጥ መርፌ መውጋት ደህንነቱ የተጠበቀ ስለመሆኑ ለመወሰን የበሽታ መከላከያ ክትባት አቅራቢ ሊረዳዎ እንደሚችልና መርፌውን ለመውጋት ጥሩ ጊዜ መቆየት እንደሆነ ለመወሰን ይረዳዎታል።

ክትባቱን ከመውሰድ በፊት ለየት ባሉ ሁኔታዎች ለመነጋገር

ሰዎች ለሞደርና/Moderna ሲወስዱ የቅድመ ጥንቃቄ ሁኔታዎች

ከዚህ የሚከተሉት ማንኛውም ሁኔታ ጋር ታሪክ ላለባቸው ሰዎች ሞደርና/Moderna ክትባት ማግኘት ሲችሉ ነገር ግን ክትባቱን ለመውሰድ ስለ በጣም ጥሩ ጊዜ እና ስለሚቀርብ ተጨማሪ ጥንቃቄ ከአጠቃላይ ህኪም/GP፤ ከበሽታ መከላከያ ክትባት ልዩ ባለሙያ ወይም ከልብ ባለሙያ/cardiologist ምክር ማግኘት ያስፈልጋል፡

- በቅርቡ (ይህም ባለፉት 6 ወራት ውስጥ) ወይም አሁን ለልብ ህመም የሚያባብስ፤ ለምሳሌ፡ myocarditis, pericarditis, endocarditis
- የማይድን የቁርጥማት ህመም (ይህም ተግባራዊ ከሆነ የልብ ህመም/myocardial እብጠት) ወይም የማይድን ህይለኛ የልብ በሽታ
- የማይድን ከፍተኛ የልብ መቆም መባባስ

የተዳከመ በሽታ መቋቋሚያ አሰራር ላለባቸው ሰዎች (immunocompromise)

በተዳከመ በሽታ መቋቋሚያ ላይ ጋር ባሉት ሰዎች የሚካተት ለበሽታ መቋቋሚያ አሰራር ላይ የሚያዳከም የጤና ህክምና ሁኔታ ላለባቸው ሰዎች ነው። እንዲሁም ለበሽታ መቋቋሚያ አሰራር ላይ የሚያዳከም መድኃኒቶችን ለሚወስዱ ሰዎች ያካትታል።

በተዳከመ በሽታ መቋቋሚያ አሰራር ላይ ጋር ላሉት ሰዎች የኮቪድ/COVID-19 ክትባትን እንዲወስዱ የአውስትራሊያ መንግሥት ብጥብቅ ያሳስባል። ሞደርና/Moderna ላይ ያለው ክትባት አይደለም። በተዳከመ በሽታ መቋቋሚያ ላይ ላሉ ሰዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ነው።

በተዳከመ በሽታ መቋቋሚያ ላይ ካሉት ሰዎች የሚካተት ከሄችአይቪ/ HIV ጋር ለሚኖሩና በኮቪድ/ COVID-19 ቫይረስ ሞትን ያካተተ በከፍተኛ ህመም ችግር ላይ ለሚጋለጡ ሰዎች ይሆናል።

በሞደርና/Moderna ከሊኒካል ሙከራዎች ከጥቂት የተረጋጋ ሄችአይቪ/ HIV ካለባቸው ቡድኖች ባሻገር በተዳከመ በሽታ መቋቋሚያ ላይ ያሉትን ሰዎች አላካተተም። በተዳከመ በሽታ መቋቋሚያ አሰራር ላይ ላሉት ሰዎች ከሌሎች ሰዎች ጋር ሲነጻጸር የሞደርና/Moderna ክትባት ምን ያህል ውጤታማ እንደሆነ አናውቅም። ሞደርና/Moderna ክትባት ለአጠቃላይ ህዝብ እንደመሆኑ መጠን በተዳከመ በሽታ መቋቋሚያ ላይ ላሉት ሰዎች ውጤታማ ላይሆን ይችል ይሆናል። ሌሎች የመከላከያ እርምጃዎችን፤ ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ እንደ የአካል እርቀትን መቀጠሉ ጠቃሚ ነው።

እርጉዝ ወይም ጡት ስለሚያጠቡ ሴቶች

ለእርጉዝ ሴቶችና ታዳጊ ወጣቶች መደበኛ ከሆኑ የ mRNA-based COVID-19 ክትባቶች አንዱን መቅረብ አለበት። በማንኛውም የእርግዝና ደረጃ ፕራዘር/Pfizer ወይም ሞደርና/Moderna ክትባትን መውሰድ። ለማርገዝ የሚሞከሩ ከሆነ ለክትባት መውሰድ ጊዜ ማራዘይ እንደሌለብዎ ወይም ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ላለማርገዝ የሚለውን ማስወገድ።

ኮቪድ/COVID-19 ጋር ያሉት እርጉዝ ሴቶች በከፍተኛ ህመም የመጋለጥ ችግር እንደሚጨምርና ለእርግዝና ተቃራኒ የሆነ ውጤት ያስከትላል። የትክክለኛ ዓለም ማስረጃ እንደሚያሳየው ለእርጉዝና ለሚያጠቡ ሴቶች የሞደርና/Moderna ክትባት ደህንነቱ የተጠበቀ እንደሆነ ነው። ክትባቱን መቸ እንደሚወሰድ በተመለከተ ከርስዎ ጤና ባለሙያ ጋር መነጋገር ይችላሉ።

የእናት ጡት የሚያጠቡ ከሆነ፤ የሞደርና/Moderna ክትባት መውሰድ ይችላሉ። ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ጡት ማጥባቱም ማቆም አያስፈልግም።

ኮቪድ/COVID-19 ታሪክ ጋር ላሉ ሰዎች

ቀደም ሲል ኮቪድ/COVID-19 ከነበረብዎት፤ ለበሽታ መከላከያ ክትባት አቅራቢዎ መናገር። ኮቪድ/COVID-19 ክትባት ከመውሰድዎ በፊት ከበሽታው ከዳኑ በኋላ እስከ ስድስት ወራት መጠበቅ እንዳለብዎት። በአቅራቢዎ በኩል ምክር ሊሰጥዎ ይችላል። በኮቪድ/COVID-19 ቀጣይ የሆነ ህመም ካለብዎት፤ ክትባቱን ለመውሰድ በጣም ጥሩ ጊዜ መቸ እንደሆነ ከህክምና አቅራቢ ህኪምዎት ጋር መነጋገር።

ሞደርና/Moderna እና ህጻናት

እድሜያቸው ≥ 12 ዓመት ወይም ከዚህ በላይ ለሆኑት ሰዎች ሞደርና/Moderna ክትባትን ለመጠቀም ጊዜያዊ ፈቃድ እንዳገኘ እና ከዚህ በታች ለሆኑት ወጣቶች መስጠት አይቻልም።

ለሞደርና/Moderna ደህንነት ስለማረጋገጥ

ለክትባት ምርመራ ጥናት የገንዘብ እርዳታ በመጨመሩ እና ለምርመራ ጥናቶች በጣም ብዙ ቁጥሮች ያሉት ፈቃደኞች መጠቀም ስለተቻለ ለሞደርና/ Moderna እና ሌሎች ኮቪድ/COVID-19 ክትባቶች በፍጥነት እንዲመረጡ አድርጓል። ሰፊ ባለ ክሊኒካል ሙከራ ላይ ወደ 30,000 ሰዎች እንደተሳተፉና ሞደርና/Moderna ክትባት ደህንነቱ የተጠበቀና ውጤታማ እንደሆነ ያሳውቃል።

አውስትራሊያ ውስጥ ላሉት ክትባቶች በሙሉ በ TGA በኩል ግምገማ ይካሄዳል። ይህም ክትባቱ ተቀባይነት እንዲያገኝ፤ የክትባቱ ደህንነት፤ ውጤታማ እና በጣም ከፍተኛ ጥራት ደረጃ እንደተመረጠ ያረጋግጣል። ለኮቪድ/COVID-19 ክትባቶች ተቀባይነት አሰራር ሂደት መግለጫ በ[TGA ድረገጽ/TGA website](https://www.tga.gov.au) ላይ ይቀርባል።

ለኮቪድ/COVID-19 ክትባቶች ደህንነት በሞላው የኮቪድ/COVID-19 በሽታ መከላከያ ክትባት ፕሮግራም ላይ ቁጥጥር ይደረጋል።

የቫክሲን-ቫሪያ/Vaxzevria (AstraZeneca) አስትራዘነካ/ AstraZeneca ክትባትን ከወሰዱ በኋላ ሊፈጠሩ የሚችሉ መጠነኛ ችግሮች፤ ይህም ከአነስተኛ ቁጥር የደም ፕላትሌት/platelet ጋር ደም መርጋት ሪፖርቶች እንደሚደረግ ነው። የአስትራዘነካ/AstraZeneca ክትባት የሚሰራበት ከሞደርና/Moderna የተለየ መንገድ ነው። ይህ ሁኔታ ከሞደርና/Moderna ኮቪድ/COVID-19 ክትባት ስለሚገናኝ የሚያሳይ መረጃ የለም።

ሊፈጠር በሚችል ችግር ጥርጣሬ ካለ ለርስዎ ክትባት አቅራቢ ወይም ሌላ ጤና ጥበቃ ባለሙያ ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ። ከዚያም እርስዎን ወክለው ለርስዎ አስተዳደር ግዛት ወይም ተራቶርይ ጤና ጥበቃ መምሪያ ወይም በቀጥታ ለTGA መደበኛ ሪፖርት ይቀርባል።

በራስዎ ሪፖርት ማድረግ ከፈለጉ፤ ከኮቪድ/ COVID-19 ክትባቶች ጋር በተዛመደ ስለሚከሰት ችግር መረጃ ለማግኘት እባክዎ በ[TGA ድረገጽ/TGA website](https://www.tga.gov.au) ላይ ማየት።